



Tabel 1

Akkerklokje *Campanula rapunculoides*



Een middelhoge tot hoge plant (van 45 tot 120 cm) met een vrij dunne, niet vertakte stengel. De bloemen zijn klok-vormig, blauw tot violet en zitten in een naar één kant gekeerde tros. De plant heeft twee soorten bladeren: onderin eironde bladeren met daarboven smallere bladeren. De plant groeit vaak in groepen.

Foto: Floris Brekelmans/
Bureau Waardenburg



- soort niet aanwezig
- soort (recent) aanwezig

1

Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Groen: Werkzaamheden mogelijk. Oranje: Werkzaamheden mogelijk: ja, mits na overleg met ecooloog en eventuele mitigerende maatregelen. Rood: Werkzaamheden mogelijk: nee, tenzij toestemming van de ecooloog en mitigerende maatregelen worden genomen.

Bestendig beheer en onderhoud (vrijstelling)

Maaien	Bij voorkeur maaien september tot juni.
Schonen	-
Baggeren	-
Begrazen	-
Snoeien/dunnen	-

Onderhoud waterkeringen	Groeiplaatsen ontzien of desnoods plant uitgraven en zo snel mogelijk opnieuw uitplanten, onder begeleiding van een ecooloog.
-------------------------	---

Onderhoud verhardingen	Gladheidbestrijding met niet schadelijke middelen (de plant is zoutgevoelig).
------------------------	---

Ruimtelijke ontwikkelingen & inrichting (vrijstelling)

Vorbereiding van nieuwe werken	Groeiplaatsen ontzien of desnoods plant uitgraven en zo snel mogelijk opnieuw uitplanten, onder begeleiding van een ecooloog.
--------------------------------	---

Verwijderen bovengrond/ graafwerkzaamheden	Groeiplaatsen ontzien of desnoods plant uitgraven en zo snel mogelijk opnieuw uitplanten, onder begeleiding van een ecooloog.
---	---

Sloop kunstwerken en gebouwen	Akkerklokje ontzien.
-------------------------------	----------------------

Bouwactiviteiten	-
------------------	---

Afdammen/dempen/vergraven	-
---------------------------	---

Groeiplaats	Landplant van vochtige, open, voedselrijke vaak omgewerkte grond op krijt, löss, rivierklei, leem en zand. Vooral aan te treffen in overgangssituaties (bijvoorbeeld in akkerranden, bermen, heggen, bosranden etc.). Op bermen, taluds, schouwpaden, langs spoorwegen. Van nature hoort het akkerklokje thuis in graanakkers, waar hij na de oogst kan profiteren van het wegvallen van concurrentie.
-------------	--

Leefwijze door het jaar heen	Bloeiperiode: juni-augustus. Vanaf augustus tot in de winter worden de zaad via wind of regenwater verspreid. De plant vermeerderd zich ook via ondergrondse uitlopers. De plant is meerjarig en overwintert met zijn knoppen op of net iets onder de grond.
------------------------------	--

Aanbevelingen	Door lichte grondbewerking worden gemakkelijk uitlopers afgehaakt en verspreid, wat tot vermeerdering van de soort leidt.
---------------	---

Vervolg: zie pagina 2



Vervolg

Akkerklokje *Campanula rapunculoides*

Verspreiding binnen Nederland	Vrij zeldzaam in Zuid-Limburg, het rivierengebied, in Zeeland en het stedelijk gebied. Daarbuiten verwilderd via tuinafval.
Belang waterschapspopulaties	Ondergeschikt belang
Status Rode lijst	-
Beschermingsstatus	
Habitatrichtlijn	-
FF-wet	Tabel 1
Bronnen	Weeda <i>et al.</i> , 2003. Van der Meijden, 2005. Schaminée, 1998. Websites: wilde-planten.nl; flora.instnat.be