



Tabel 3

Baardvleermuis *Myotis mystacinus*



Kenmerkend voor Myotis-soorten: contrast tussen lichte buik en donkere rug. Oren altijd langer dan breed met puntige tragus. Kleine soort. Rug geel- tot grauwbrown. Buik licht bruingrijs. Snuit bruin tot zwart. Oren en onderarmen donkerbruin tot zwart. Vleugels vrij smal.

Foto: Christophe Brochard



- soort niet waargenomen
- soort (recent) waargenomen

Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec

Groen: Werkzaamheden mogelijk. Oranje: Werkzaamheden mogelijk: ja, mits na overleg met ecooloog en eventuele mitigerende maatregelen. Rood: Werkzaamheden mogelijk: nee, tenzij toestemming van de ecooloog en mitigerende maatregelen worden genomen.

Bestendig beheer en onderhoud (vrijstelling mits gebruik van gedragscode)

Maaien	-
Schonen	-
Baggeren	-
Begrazen	-
Snoeien/dunnen	Zie gedragscode, aanvullend: Vliegroutes/lijnvormige landschapselementen in tact laten; niet alle bomen verwijderen. Bij verwijderen van lijnvormige landschapselementen die van belang zijn als vliegroute ontheffing aanvragen. Periode waarin werkzaamheden bij voorkeur plaats vinden: augustus-april. Aanbevolen wordt om pas te starten met de werkzaamheden nadat is vastgesteld dat de zomerverblijfplaatsen zijn verlaten.
Onderhoud waterkeringen	-
Onderhoud verhardingen	-

Ruimtelijke ontwikkelingen & inrichting (ontheffingsplicht)

Vorbereiding van nieuwe werken	Zie gedragscode
Verwijderen bovengrond/graafwerkzaamheden	-
Sloop kunstwerken en gebouwen	Zie gedragscode, aanvullend: Pas nadat is vastgesteld dat de verblijfplaatsen zijn verlaten, kan worden gestart met werkzaamheden. Periode waarin werkzaamheden bij voorkeur plaats vinden: - In geval van zomerverblijfplaats: augustus-april - In geval van winterverblijfplaats: april-half augustus
Bouwactiviteiten	-
Afdammen/dempen/vergraven wateren	Zie gedragscode, aanvullend: Bij verwijderen/aantasten van wateren die van belang zijn als foerageergebied ontheffing aanvragen. Vervolg: zie pagina 2

3



Vervolg

Baardvleermuis *Myotis mystacinus*

Leefgebied	Besloten landschappen met veel bos.
Gebruik van het leefgebied	<i>Zomerverblijven</i> : gebouwen (huizen, kerken) en bomen. Er wordt een netwerk van verblijfplaatsen bewoond. <i>Winterverblijven</i> : kalksteengroeven, bunkers, forten, (ijs)kelders, vestingwerken, kerken, etc. <i>Voerageergebied</i> : bospaden, bosranden en open plekken in bos, soms boven water. <i>Vliegroutes</i> : lijnvormige landschapselementen (o.a. lanen, paden, bosrand). <i>Paarplaatsen</i> : zie winterverblijven.
Voornaamste voedselbronnen	Muggen, eendagsvliegen, kleine libellen, kevers, nachtvlinders.
Leefwijze door het jaar heen	Leven jaarrond in kolonies. Nachtactief. Jachtgebied vaak binnen straal van 1 km rondom kolonieplaats. In zomer leven vrouwtjes in kraamkolonies (20-70 dieren). Mannetjes leven zomers apart van de vrouwtjes. Kraamtijd: half juni-augustus. Paartijd: najaar. Winterslaap: oktober-maart/april. Afstand tussen winter- en zomerverblijven 10-80 km.
Aanbevelingen	<ul style="list-style-type: none">- Veilig stellen van opgaande elementen in gesloten landschap, (gedeeltelijk) sparen van houtwallen en singels.- Beheer van bos en bomen richten op behoud van oude bomen en boomholtes en op ontstaan van boomholtes.- Herplant van singels, bomenrijen.
Belang waterschapspopulaties	Groot nationaal belang
Verspreiding binnen Nederland	Vrij zeldzaam. In alle provincies behalve Flevoland. Geen waarnemingen bekend van Waddeneilanden. Zwaartepunt van verspreiding ligt in oost en zuid Nederland: langs de randen van de Veluwe, het IJsseldal, Zuid-Oost Overijssel en Zuid-Limburg. De grootte van de Nederlandse populatie wordt geschat op 2500-4000 dieren.
Rode lijst	-
Beschermingsstatus	
Habitatrichtlijn	Bijlage IV
FF-wet	Tabel 3
Bronnen	Lange <i>et al.</i> 1994; Broekhuizen <i>et al.</i> 1992; Limpens <i>et al.</i> 1997; Websites: www.minlnv.nederlandsesoorten.nl