




Tabel 2

Beenbreek *Narthecium ossifragum*



Een plant van 10 tot 30 cm groot. De bloemen zijn geel en zitten in een tros. Na de bloei zijn de bloemen oranjegekleurd. Beenbreek heeft lange en smalle bladeren onderin met daarboven veel kleinere bladeren.

Foto: Floris Brekelmans/
Bureau Waardenburg



○ soort niet aanwezig
● soort (recent) aanwezig

2

Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec

Groen: Werkzaamheden mogelijk. Oranje: Werkzaamheden mogelijk: ja, mits na overleg met ecooloog en eventuele mitigerende maatregelen. Rood: Werkzaamheden mogelijk: nee, tenzij toestemming van de ecooloog en mitigerende maatregelen worden genomen.

Bestendig beheer en onderhoud (vrijstelling, mits gebruik gedragscode)

Maaien	Zie gedragscode, aanvullend: Vanaf september.
Schonen	Zie gedragscode
Baggeren	Zie gedragscode
Begrazen	Zie gedragscode, aanvullend: Geen begrazing.
Snoeien/dunnen	-
Onderhoud waterkeringen	Zie gedragscode, aanvullend: Groeiplaatsen ontzien of desnoods plant uitgraven en zo snel mogelijk opnieuw uitplanten, onder begeleiding van een deskundige.
Onderhoud verhardingen	Zie gedragscode

Ruimtelijke ontwikkelingen & inrichting (vrijstelling, mits gebruik gedragscode)

Vorbereiding van nieuwe werken	Zie gedragscode, aanvullend: Groeiplaatsen ontzien of desnoods plant uitgraven en zo snel mogelijk opnieuw uitplanten, onder begeleiding van een deskundige.
Verwijderen bovengrond/ graafwerkzaamheden	Zie gedragscode, aanvullend: Groeiplaatsen ontzien of desnoods plant uitgraven en zo snel mogelijk opnieuw uitplanten, onder begeleiding van een deskundige.
Sloop kunstwerken en gebouwen	-
Bouwactiviteiten	-
Afdammen/dempen/vergraven	Zie gedragscode, aanvullend: Geen grootschalige ingrepen in de waterhuishouding doorvoeren.

Groeiplaats	De soort komt voor op zonnige plaatsen op natte, voedselarme, (matige) zure grond op veen, zand- en leemgrond. De soort is karakteristiek voor vegetaties van hoogveenranden en natte heide. Beenbreek is afhankelijk van lokale, basenarme kwel of andere zwak gebufferde condities. Ze groeit bijvoorbeeld vaak bij het begin van heidebeekjes (stroeten) gevoed met lokaal grondwater.
-------------	---

Leefwijze door het jaar heen	Bloeiperiode: juni-augustus. Zaadverspreiding in september en oktober via wind en water. Het zaad blijft zelden langer dan één jaar kiemkrachtig. Voor kieming zijn kale, maar vochtige locaties nodig. De plant vermeerderd zich ook vegetatief. De plant is meerjarig en overwintert met zijn knoppen op of onder de grond of onder water.
------------------------------	--

Vervolg: zie pagina 2



Vervolg

Beenbreek *Narthecium ossifragum*

Aanbevelingen	<ul style="list-style-type: none">- In stand houden van horizontale en verticale grondwaterbewegingen.- Verdroging bestrijden door onder andere de groeiplaatsen geleidelijk te vernatten. Een te grote invloed van regenwater, en een te langdurige inundatie zijn echter nadelig.- Vergrassing tegengaan door kleinschalig te plagen.
Verspreiding binnen Nederland	Vooral in Noord- en West-Drenthe, in Zuidoost Friesland, Twente, op de Veluwe en in de zuidelijke helft van Noord-Brabant.
Belang waterschapspopulaties	Nationaal belang
Status Rode lijst	Bedreigd
Beschermingsstatus	
Habitatrichtlijn	-
FF-wet	Tabel 2
Bronnen	Weeda <i>et al.</i> , 2003. Van der Meijden, 2005. Schaminée <i>et al.</i> , 1995. Websites: flora.instnat.be ; www.floron.nl