




Tabel 2

Beenbreek *Narthecium ossifragum*



Een plant van 10 tot 30 cm groot. De bloemen zijn geel en zitten in een tros. Na de bloei zijn de bloemen oranjegekleurd. Beenbreek heeft lange en smalle bladeren onderin met daarboven veel kleinere bladeren.

Foto: Floris Brekelmans/
Bureau Waardenburg



○ soort niet aanwezig
● soort (recent) aanwezig

2

| Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | | | | | | | | | | |

Groen: Werkzaamheden mogelijk. Oranje: Werkzaamheden mogelijk: ja, mits na overleg met ecooloog en eventuele mitigerende maatregelen. Rood: Werkzaamheden mogelijk: nee, tenzij toestemming van de ecooloog en mitigerende maatregelen worden genomen.

Bestendig beheer en onderhoud (vrijstelling, mits gebruik gedragscode)

| | |
|-------------------------|--|
| Maaien | Zie gedragscode, aanvullend: Vanaf september. |
| Schonen | Zie gedragscode |
| Baggeren | Zie gedragscode |
| Begrazen | Zie gedragscode, aanvullend: Geen begrazing. |
| Snoeien/dunnen | - |
| Onderhoud waterkeringen | Zie gedragscode, aanvullend: Groeiplaatsen ontzien of desnoods plant uitgraven en zo snel mogelijk opnieuw uitplanten, onder begeleiding van een deskundige. |
| Onderhoud verhardingen | Zie gedragscode |

Ruimtelijke ontwikkelingen & inrichting (vrijstelling, mits gebruik gedragscode)

| | |
|---|--|
| Vorbereiding van nieuwe werken | Zie gedragscode, aanvullend: Groeiplaatsen ontzien of desnoods plant uitgraven en zo snel mogelijk opnieuw uitplanten, onder begeleiding van een deskundige. |
| Verwijderen bovengrond/ graafwerkzaamheden | Zie gedragscode, aanvullend: Groeiplaatsen ontzien of desnoods plant uitgraven en zo snel mogelijk opnieuw uitplanten, onder begeleiding van een deskundige. |
| Sloop kunstwerken en gebouwen | - |
| Bouwactiviteiten | - |
| Afdammen/dempen/vergraven | Zie gedragscode, aanvullend: Geen grootschalige ingrepen in de waterhuishouding doorvoeren. |

| | |
|-------------|---|
| Groeiplaats | De soort komt voor op zonnige plaatsen op natte, voedselarme, (matige) zure grond op veen, zand- en leemgrond. De soort is karakteristiek voor vegetaties van hoogveenranden en natte heide. Beenbreek is afhankelijk van lokale, basenarme kwel of andere zwak gebufferde condities. Ze groeit bijvoorbeeld vaak bij het begin van heidebeekjes (stroeten) gevoed met lokaal grondwater. |
|-------------|---|

| | |
|------------------------------|--|
| Leefwijze door het jaar heen | Bloeiperiode: juni-augustus. Zaadverspreiding in september en oktober via wind en water. Het zaad blijft zelden langer dan één jaar kiemkrachtig. Voor kieming zijn kale, maar vochtige locaties nodig. De plant vermeerderd zich ook vegetatief. De plant is meerjarig en overwintert met zijn knoppen op of onder de grond of onder water. |
|------------------------------|--|

Vervolg: zie pagina 2



Vervolg

Beenbreek *Narthecium ossifragum*

| | |
|-------------------------------|---|
| Aanbevelingen | <ul style="list-style-type: none">- In stand houden van horizontale en verticale grondwaterbewegingen.- Verdroging bestrijden door onder andere de groeiplaatsen geleidelijk te vernatten. Een te grote invloed van regenwater, en een te langdurige inundatie zijn echter nadelig.- Vergrassing tegengaan door kleinschalig te plagen. |
| Verspreiding binnen Nederland | Vooral in Noord- en West-Drenthe, in Zuidoost Friesland, Twente, op de Veluwe en in de zuidelijke helft van Noord-Brabant. |
| Belang waterschapspopulaties | Nationaal belang |
| Status Rode lijst | Bedreigd |
| Beschermingsstatus | |
| Habitatrichtlijn | - |
| FF-wet | Tabel 2 |
| Bronnen | Weeda <i>et al.</i> , 2003. Van der Meijden, 2005. Schaminée <i>et al.</i> , 1995. Websites: flora.instnat.be ; www.floron.nl |