



Bergeend *Tadorna tadorna*



Een middelgrote gansachtige vogel met bont verenkleed, bovenzijde wit met donkergroene kop, een rode snavel, onderzijde met een brede kastanjebruine borstband.

Foto: Eelke Schoppers

Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Groen: Werkzaamheden mogelijk. Oranje: Werkzaamheden mogelijk: ja, mits na overleg met ecooloog en eventuele mitigerende maatregelen. Rood: Werkzaamheden mogelijk: nee, tenzij toestemming van de ecooloog en mitigerende maatregelen worden genomen.

Bestendig beheer en onderhoud (vrijstelling, mits gebruik gedragscode)

Maaien	Zie gedragscode, aanvullend: Waar de soort (mogelijk) broedt alleen in de periode van half september t/m maart. De bergeend is een holenbroeder, maar maakt ook nesten tussen vegetatie en bouwsels in met name oevers.
Schonen	Zie gedragscode, aanvullend: Als onder maaien.
Baggeren	Zie gedragscode, aanvullend: Als onder maaien.
Snoeien/dunnen	-
Onderhoud waterkeringen	-
Onderhoud verhardingen	-

Ruimtelijke ontwikkelingen & inrichting (vrijstelling, mits gebruik gedragscode)

Vorbereiding van nieuwe werken	Zie gedragscode
Verwijderen bovengrond/ graafwerkzaamheden	Zie gedragscode, aanvullend: Waar de soort (mogelijk) broedt alleen in de periode van half september t/m maart. De bergeend is een holenbroeder, maar maakt ook nesten tussen vegetatie en bouwsels in met name oevers.
Slopen kunstwerken/gebouwen	Zie gedragscode, aanvullend: Als onder verwijderen bovengrond.
Bouwactiviteiten	Zie gedragscode, aanvullend: Als onder verwijderen bovengrond.
Afdammen/dempen/vergraven	Zie gedragscode, aanvullend: Als onder verwijderen bovengrond.
Leefgebied	Broedt nabij zout en zoekt open water met een modderige bodem. In de winter in groepen bij grotere wateren en aan de kust.
Gebruik van het leefgebied	Jaarrond te vinden in waterrijke gebieden. In de ruiperiode (juni-juli) concentreren de vogels zich in de Waddenzee.
Voornaamste voedselbronnen	Wadslakjes, kleine weekdieren, wormen, kreeftachtigen en plantaardig materiaal.
Leefwijze door het jaar heen	De broedperiode loopt van begin april tot half september. In april balts en in april-september nesten en paren met jongen. Buiten het broedseizoen verblijven de vogels voornamelijk in getijdengebieden (Waddenzee, Deltagebied en de Franse Atlantische kust).



- soort niet broedend
- mogelijk broedgeval
- broedgeval waarschijnlijk/zeker





Vervolg

Bergeend *Tadorna tadorna*

Locatie nest	Holenbroeder, maar maakt ook nesten tussen vegetatie en bouwsels.
Aanbevelingen	-
Belang waterschapspopulaties	Nationaal belang
Verspreiding binnen Nederland	In Nederland vrij algemeen tot algemeen. Tijdens het broedseizoen voornamelijk in de kustprovincies en in het rivierengebied.
Rode lijst	-
Beschermingsstatus Vogelrichtlijn	Voor deze soort zijn Natura 2000-gebieden aangewezen.
FF-wet	Strengbeschermd, gelijkgesteld aan tabel 3
Bronnen	Literatuur: van de Kam <i>et al.</i> 1999; Snow & Perrins, 1998; LNV, 2009; SOVON, 2002.

