



## Blauwe kiekendief *Circus cyaneus*



Een slanke, middelgrote roofvogel met lange vleugels. Een volwassen mannetje heeft een lichte tot grijze vleugel met contrasterende zwart afgebakende vleugeltoppen. Een volwassen vrouwtje heeft een uniform donkere onder- en bovenzijde met contrasterende witte stuit en gebandeerde staart.

Foto: Rein Hofman



- soort niet broedend
- mogelijk broedgeval
- broedgeval waarschijnlijk/zeker

Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec

Groen: Werkzaamheden mogelijk. Oranje: Werkzaamheden mogelijk: ja, mits na overleg met ecooloog en eventuele mitigerende maatregelen. Rood: Werkzaamheden mogelijk: nee, tenzij toestemming van de ecooloog en mitigerende maatregelen worden genomen.

### Bestendig beheer en onderhoud (vrijstelling, mits gebruik gedragscode)

Maaien	Zie gedragscode, aanvullend: Waar de soort (mogelijk) broedt alleen in de periode van half september tot half april. De blauwe kiekendief broedt doorgaans in dichte, besloten vegetatie zoals struiken of sterk verruigde kruidenvegetaties.
Schonen	Zie gedragscode, aanvullend: Als onder maaien.
Baggeren	Zie gedragscode, aanvullend: Als onder maaien.
Snoeien/dunnen	Zie gedragscode, aanvullend: Als onder maaien. Bovendien is het wenselijk om slaapplaatsen in de winter ongemoeid te laten.
Onderhoud waterkeringen	-
Onderhoud verhardingen	-

### Ruimtelijke ontwikkelingen & inrichting (vrijstelling, mits gebruik gedragscode)

Vorbereiding van nieuwe werken	Zie gedragscode
Verwijderen bovengrond/graafwerkzaamheden	Zie gedragscode, aanvullend: Waar de soort (mogelijk) broedt alleen in de periode van half september tot half april. De blauwe kiekendief broedt doorgaans in dichte besloten vegetatie zoals struiken of sterk verruigde kruidenvegetaties.
Slopen kunstwerken/gebouwen	Zie gedragscode, aanvullend: Als onder verwijderen bovengrond.
Bouwactiviteiten	Zie gedragscode, aanvullend: Als onder verwijderen bovengrond.
Afdammen/dempen/vergraven	Zie gedragscode, aanvullend: Als onder verwijderen bovengrond.

**Leefgebied**  
 Broedt in open gebieden als duinen, kwelders en cultuurgraslanden. In de winter talrijker door aanvulling van overwinterende populaties uit Noord- en Oost-Europa. In deze periode ook in landbouw- en heidegebieden.

**Gebruik van het leefgebied**  
 In het broedseizoen in uitgestrekte open gebieden met dichte, lage vegetatie. Buiten het broedseizoen in diverse open gebieden.

Vervolg: zie pagina 2



## Vervolg

## Blauwe kiekendief *Circus cyaneus*

Voornaamste voedselbronnen	Kleine zoogdieren en vogels.
Leefwijze door het jaar heen	De broedperiode loopt van midden april tot midden september. Vanaf midden april balts en van midden april-midden september nesten en paren met jongen. Buiten het broedseizoen zijn de vogels te vinden in diverse open gebieden.
Locatie nest	In dichte besloten vegetatie (veelal struiken).
Aanbevelingen	<ul style="list-style-type: none"><li>- Vermijden van betreding en het uitvoeren van werkzaamheden in potentiële broedbiotopen gedurende het broedseizoen.</li><li>- Vermijden van betreding en het uitvoeren van werkzaamheden rond zonsopgang en zonsondergang in de omgeving van slaappleatsen.</li></ul>
Belang waterschapspopulaties	Ondergeschikt belang
Verspreiding binnen Nederland	In Nederland zeldzaam tot plaatselijk algemeen. Tijdens het broedseizoen voornamelijk in de noordelijke kustprovincies en de Oostvaardersplassen.
Rode lijst	Kwetsbaar
Beschermingsstatus Vogelrichtlijn	Voor deze soort zijn Natura 2000-gebieden aangewezen.
FF-wet	Strengbeschermd, gelijkgesteld aan tabel 3
Bronnen	Literatuur: Bijlsma <i>et al.</i> , 2003; den Boer <i>et al.</i> , 2000; Snow & Perrins, 1998; LNV, 2009; SOVON, 2002. Websites: <a href="http://www.minlnv.nl">www.minlnv.nl</a> ; <a href="http://www.nederlandse-soorten.nl">www.nederlandse-soorten.nl</a> ; <a href="http://www.bto.org">www.bto.org</a>

