



Tabel 2

Blauwe zeedistel *Eryngium maritimum*



Een blauwgroene distel van 0,30 tot 0,60 cm hoog. De distel is bovenin fel blauw. De bloemen zijn wit of blauw. De bladeren zijn stekelig en voelen ruw aan.

Foto: Liesbeth Leusink/
Bureau Waardenburg

Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Groen: Werkzaamheden mogelijk. Oranje: Werkzaamheden mogelijk: ja, mits na overleg met ecooloog en eventuele mitigerende maatregelen. Rood: Werkzaamheden mogelijk: nee, tenzij toestemming van de ecooloog en mitigerende maatregelen worden genomen.

Bestendig beheer en onderhoud (vrijstelling, mits gebruik gedragscode)


Maaien	Zie gedragscode, aanvullend: Maaien vanaf september.
Schonen	-
Baggeren	-
Begrazen	Zie gedragscode
Snoeien/dunnen	-
Onderhoud waterkeringen	Zie gedragscode, aanvullend: Groeiplaatsen ontzien of desnoods plant uitgraven en zo snel mogelijk opnieuw uitplanten, onder begeleiding van een deskundige.
Onderhoud verhardingen	Zie gedragscode

Ruimtelijke ontwikkelingen & inrichting (vrijstelling, mits gebruik gedragscode)

Vorbereiding van nieuwe werken	Zie gedragscode, aanvullend: Groeiplaatsen ontzien of desnoods plant uitgraven en zo snel mogelijk opnieuw uitplanten, onder begeleiding van een deskundige.
Verwijderen bovengrond/ graafwerkzaamheden	Zie gedragscode, aanvullend: Groeiplaatsen ontzien of desnoods plant uitgraven en zo snel mogelijk opnieuw uitplanten, onder begeleiding van een deskundige.
Sloop kunstwerken en gebouwen	-
Bouwactiviteiten	-
Afdammen/dempen/vergraven	Zie gedragscode, aanvullend: Groeiplaatsen ontzien of desnoods plant uitgraven en zo snel mogelijk opnieuw uitplanten, onder begeleiding van een deskundige.

Groeiplaats	Plant van zonnige, open, droge, matige voedselrijke tot voedselrijke, dikwijls brakke grond. De soort komt voor in de duinen, in de zeereep en op omgewerkte plaatsen. Komt voor op min of meer stuivend, kalkrijk duinzand. Blauwe zeedistel is karakteristiek voor helmvegetaties. Voor zijn stikstofvoorziening is de plant afhankelijk van de toevoer van organisch materiaal.
-------------	--

Vervolg: zie pagina 2



○ soort niet aanwezig
● soort (recent) aanwezig

2



Vervolg

Blauwe zeedistel *Eryngium maritimum*

Leefwijze door het jaar heen	Bloeiperiode: juni-augustus. Blauwe zeedistel is in staat om zijn bloei uit te stellen wanneer er te weinig organisch materiaal voor handen is. Zaadverspreiding vanaf augustus tot in de winter via dieren en water. Het zaad blijft zelden langer dan één jaar kiemkrachtig. De plant is meerjarig en overwintert met zijn knoppen op of onder de grond. Tijdens de winter behoudt de plant zijn bladeren.
Aanbevelingen	<ul style="list-style-type: none">- Dynamisch beheer. De soort heeft baat bij zandverstuiving.- Beperkte toevoer van organisch materiaal rond de groeiplaatsen stimuleren. De soort doet het bijvoorbeeld goed op plekken met tuin- of visafval of op plekken waar stro wordt aangevoerd. Onder natuurlijke omstandigheden komt de plant voor op oud, ondergestoven vloedmerk.
Verspreiding binnen Nederland	Vooral langs de Nederlandse kust en op enkele plekken langs het IJsselmeer.
Belang waterschapspopulaties	Ondergeschikt belang.
Status Rode lijst	-
Beschermingsstatus	
Habitatrichtlijn	-
FF-wet	Tabel 2
Bronnen	Weeda <i>et al.</i> , 2003. Van der Meijden, 2005. Schaminée <i>et al.</i> , 1998. Websites: flora.instnat.be ; www.floron.nl ; www.soortenbank.nl