



Bosuil *Strix aluco*



Forse, compacte uil met grote, ronde kop en geheel zwarte ogen. Roodbruin of grijsbruin verenkleed met vlekken en strepen. Brede, afgeronde vleugels. Directe vlucht met snelle vleugelslagen.

Foto: Han Bouwmeester/Buiten-Beeld



- soort niet broedend
- mogelijk broedgeval
- broedgeval waarschijnlijk/zeker

Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec

Groen: Werkzaamheden mogelijk. Oranje: Werkzaamheden mogelijk: ja, mits na overleg met ecooloog en eventuele mitigerende maatregelen. Rood: Werkzaamheden mogelijk: nee, tenzij toestemming van de ecooloog en mitigerende maatregelen worden genomen.

Bestendig beheer en onderhoud (vrijstelling, mits gebruik gedragscode)

Maaien	-
Schonen	-
Baggeren	-
Snoeien/dunnen	Zie gedragscode, aanvullend: Bosuilen broeden vooral in boomholten of nestkasten. Soms ook in konijnenholten, op de kale bosbodem, in oude eksternesten of in gebouwen. Snoeien in de periode van augustus tot half januari. Met name het behoud van oude bomen met potentiële nestholten is essentieel, als ook de samenhang tussen houtwallen, bomenrijen en boschages.
Onderhoud waterkeringen	-
Onderhoud verhardingen	-

Ruimtelijke ontwikkeling en inrichting (vrijstelling, mits gebruik gedragscode)

Vorbereiding van nieuwe werken	Zie gedragscode
Verwijderen bovengrond/graafwerkzaamheden	-
Sloop kunstwerken en gebouwen	Zie gedragscode, aanvullend: Incidenteel betrekken bosuilen gebouwen en kunnen dan jaarrond van deze objecten afhankelijk zijn. Aan- of afwezigheid van bosuilen dient voorafgaand aan sloop op elk moment van het jaar te worden vastgesteld.
Bouwactiviteiten	Zie gedragscode, aanvullend: Waar de soort (mogelijk) broedt: als onder sloop.
Afdammen/dempen/vergraven	-
Leefgebied	Oude bossen (vooral loofbos en gemengd bos), landgoederen, parken, groene villawijken etc. Soms ook in open (agrarisch) gebied mits voldoende erfbeplanting en/of boschages met oude bomen aanwezig zijn.
Gebruik van het leefgebied	Gehele jaar in hetzelfde territorium aanwezig. Sterk gebonden aan (oude) bomen met holten om in te broeden, in te rusten en om vanuit te jagen (uitkijkposten).
Voornaamste voedselbronnen	Kleine zoogdieren, vogels, amfibieën, regenwormen en kevers.
Leefwijze door het jaar heen	De broedperiode loopt van eind januari tot begin augustus. De balts vindt vooral plaats in oktober-november. Eieren en nesten met jongen vooral in februari tot eind mei. Vliegvlugge jongen in de buurt van de nestlocatie tot in augustus.

Vervolg: zie pagina 2



Vervolg

Bosuil *Strix aluco*

Locatie nest	Vooral in boomholten of nestkasten. Soms ook in konijnenholten, op de kale bosbodem, in oude eksternesten of in gebouwen.
Aanbevelingen	<ul style="list-style-type: none">- Nesten niet jaarrond beschermd maar door LNV wordt wel inventarisatie van nesten gewenst omdat de nesten wel jaarrond beschermd zijn als zwaarwegende feiten of ecologische omstandigheden dat rechtvaardigen.- Handhaven en bevorderen van de ontwikkeling van oude bomen met holten en structuren van bomen waarbinnen het nest gelegen is (bijvoorbeeld bomenrijen, bosranden).- Vermijden van het uitvoeren van werkzaamheden op en rond broedlocaties gedurende het broedseizoen (met name snoeien en dunnen) en het behouden van jaarlijks gebruikte nestbomen.- Beheer van broedgebieden richten op hoog voedselaanbod (in half open tot gesloten land schap veel afwisseling in de begroeiing waarborgen).
Belang Waterschapspopulaties	Ondergeschikt belang.
Verspreiding binnen Nederland	Komt in Nederland algemeen voor in bosrijke gebieden, vooral in het midden en zuiden van het land (incl. de duinen van Holland). Ontbreekt grotendeels in Groningen, Friesland, Zeeland, de IJsselmeerpolders en op de Waddeneilanden.
Rode lijst 2004	-
Beschermingsstatus Vogelrichtlijn	Voor deze soort zijn geen Natura 2000-gebieden aangewezen.
FF-wet	Strengbeschermd, gelijkgesteld aan tabel 3. Niet jaarrond beschermd nest, wel inventarisatie gewenst.
Bronnen	Literatuur: Bijlsma <i>et al.</i> , 2001; Snow & Perrins 1998; LNV, 2009; SOVON, 2002. Websites: www.minlnv.nl , www.nederlandsesoorten.nl .

