



Bruine kiekendief *Circus aeruginosus*



Slanke, middelgrote roofvogel met een vrij brede vleugelbasis. Een volwassen mannetje heeft een lichte onderzijde en een lichte baan op de bovenvleugel, met contrasterende zwart afgebakende vleugeltoppen. Een volwassen vrouwtje heeft een uniform donkere onder- en bovenzijde met een lichte kop.

Foto: Hans Gebuis/Buiten-Beeld

Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Groen: Werkzaamheden mogelijk. Oranje: Werkzaamheden mogelijk: ja, mits na overleg met ecooloog en eventuele mitigerende maatregelen. Rood: Werkzaamheden mogelijk: nee, tenzij toestemming van de ecooloog en mitigerende maatregelen worden genomen.

Bestendig beheer en onderhoud (vrijstelling, mits gebruik gedragscode)

Maaien	Zie gedragscode, aanvullend: Waar de soort (mogelijk) broedt alleen in de periode van half augustus t/m maart. De bruine kiekendief broedt doorgaans in dichte riet- en moerasvegetatie of op waterplanten in ondiep water.
Schonen	Zie gedragscode, aanvullend: Als onder maaien.
Baggeren	Zie gedragscode, aanvullend: Als onder maaien.
Snoeien/dunnen	-
Onderhoud waterkeringen	-
Onderhoud verhardingen	-

Ruimtelijke ontwikkelingen & inrichting (vrijstelling, mits gebruik gedragscode)

Vorbereiding van nieuwe werken	Zie gedragscode
Verwijderen bovengrond/ graafwerkzaamheden	Zie gedragscode, aanvullend: Waar de soort (mogelijk) broedt alleen in de periode van half augustus t/m maart. De blauwe kiekendief broedt doorgaans in dichte riet- en moerasvegetatie of op waterplanten in ondiep water.
Slopen kunstwerken/gebouwen	Zie gedragscode, aanvullend: Als onder verwijderen bovengrond.
Bouwactiviteiten	Zie gedragscode, aanvullend: Als onder verwijderen bovengrond.
Afdammen/dempen/vergraven	Zie gedragscode, aanvullend: Als onder verwijderen bovengrond.

Leefgebied	Broedt in rietvelden en rietkragen langs watergangen. In de winter migreert de soort richting Zuid-Europa en Afrika. Enkele exemplaren overwinteren in Nederland.
------------	--

Gebruik van het leefgebied	In het broedseizoen in uitgestrekte rietmoerassen. Buiten het broedseizoen in diverse waterrijke gebieden. Naarmate het winterseizoen nadert, migreert het grootste deel van de populatie naar moerasgebieden in Zuid-Europa en Afrika.
----------------------------	---

Voornaamste voedselbronnen	Kleine zoogdieren, vogels en insecten.
----------------------------	--

Leefwijze door het jaar heen	De broedperiode loopt van begin april tot midden augustus. Vanaf begin april balts en van midden april-midden augustus nesten en paren met jongen. Buiten het broedseizoen zijn de vogels te vinden in waterrijke gebieden.
------------------------------	---

Vervolg: zie pagina 2



- soort niet broedend
- mogelijk broedgeval
- broedgeval waarschijnlijk/zeker





Vervolg

Bruine kiekendief *Circus aeruginosus*

Locatie nest	In dichte riet- en moerasvegetatie, of op waterplanten in ondiep water.
Aanbevelingen	<ul style="list-style-type: none">- Vermijd wijzigingen van het waterpeil binnen de voortplantingsperiode.- Vermijd betreding en het uitvoeren van werkzaamheden in potentiële broedbiotopen gedurende het broedseizoen.- Vermijd betreding en het uitvoeren van werkzaamheden rond zonsopgang en zonsondergang in de omgeving van slaappleatsen.
Belang waterschapspopulaties	Nationaal belang
Verspreiding binnen Nederland	In Nederland algemeen. Tijdens het broedseizoen in vrij hoge dichtheden in laag Nederland, voornamelijk ten westen van de lijn Dollard-Saeftinge.
Rode lijst	-
Beschermingsstatus Vogelrichtlijn	Voor deze soort zijn Natura 2000-gebieden aangewezen.
FF-wet	Strengbeschermd, gelijk gesteld aan tabel 3
Bronnen	Literatuur: Bijlsma <i>et al.</i> , 2003; Snow, & Perrins, 1998; LNV, 2009; SOVON, 2002. Websites: www.minlnv.nl ; www.nederlandsesoorten.nl ; www.bto.org

