



Dodaars *Tachybaptus ruficollis*



Kleine fuut met een vrij korte hals. Volwassen dieren hebben een bruine oorstreek en voorhals, met gele mondhoek.

Foto: Bureau Waardenburg



- soort niet broedend
- mogelijk broedgeval
- broedgeval waarschijnlijk/zeker

Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Groen: Werkzaamheden mogelijk. Oranje: Werkzaamheden mogelijk: ja, mits na overleg met ecooloog en eventuele mitigerende maatregelen. Rood: Werkzaamheden mogelijk: nee, tenzij toestemming van de ecooloog en mitigerende maatregelen worden genomen.

Bestendig beheer en onderhoud (vrijstelling, mits gebruik gedragscode)

Maaien	Zie gedragscode, aanvullend: Waar de soort (mogelijk) broedt alleen in de periode van half oktober t/m februari. De dodaars broedt op een drijvend nest op het water of in de oever.
Schonen	Zie gedragscode, aanvullend: Als onder maaien.
Baggeren	Zie gedragscode, aanvullend: Als onder maaien.
Snoeien/dunnen	-
Onderhoud waterkeringen	-
Onderhoud verhardingen	-

Ruimtelijke ontwikkelingen & inrichting (vrijstelling, mits gebruik gedragscode)

Vorbereiding van nieuwe werken	Zie gedragscode
Verwijderen bovengrond/graafwerkzaamheden	Zie gedragscode, aanvullend: Waar de soort (mogelijk) broedt alleen in de periode van half oktober t/m februari. Dodaars broeden op het water of in de oever.
Slopen kunstwerken/gebouwen	Zie gedragscode, aanvullend: Als onder verwijderen bovengrond.
Bouwactiviteiten	Zie gedragscode, aanvullend: Als onder verwijderen bovengrond.
Afdammen/dempen/vergraven	Zie gedragscode, aanvullend: Als onder verwijderen bovengrond.
Leefgebied	Broedt op vennen en andere begroeide ondiepe wateren.
Gebruik van het leefgebied	Jaarrond te vinden in gebieden met open water. Buiten het broedseizoen op grotere wateren en nabij de kust.
Voornaamste voedselbronnen	Macrofauna, amfibieën en vis.
Leefwijze door het jaar heen	De broedperiode loopt van begin maart tot midden oktober. Vanaf begin maart balts en van half maart-midden oktober nesten en paren met jongen. Buiten de broedperiode individueel of in kleine groepen op grote wateren.
Locatie nest	Vaak een drijvend nest in dichte vegetatie.
Aanbevelingen	-
Belang waterschapspopulaties	Nationaal belang.
Verspreiding binnen Nederland	In Nederland algemeen. Tijdens het broedseizoen voornamelijk in Drenthe, Noord-Brabant en Flevoland.
Rode lijst	-

Vervolg: zie pagina 2



Vervolg

Dodaars *Tachybaptus ruficollis*

Beschermingsstatus Vogelrichtlijn Voor deze soort zijn Natura 2000-gebieden aangewezen.

FF-wet Strengbeschermd, gelijkgesteld aan tabel 3

Bronnen Literatuur: Snow & Perrins, 1998; LNV, 2009; SOVON, 2002.

Websites: www.minlnv.nl;

www.nederlandsesoorten.nl; www.bto.org

