




Tabel 1

Egel *Erinaceus europaeus*



Een klein zoogdier met een spitse snuit en zwarte ogen. Hij is bruin van kleur en heeft circa 6000 stekels. Bij dreigend gevaar rolt de egel zich op tot een bolletje, waarbij alleen zijn stekels zichtbaar blijven.

Foto: Bert Blok



- soort niet waargenomen
- soort (recent) waargenomen

1

Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Groen: Werkzaamheden mogelijk. Oranje: Werkzaamheden mogelijk: ja, mits na overleg met ecooloog en eventuele mitigerende maatregelen. Rood: Werkzaamheden mogelijk: nee, tenzij toestemming van de ecooloog en mitigerende maatregelen worden genomen.

Bestendig beheer en onderhoud (vrijstelling)

Maaien	Vegetatie vooraf controleren op egels (indien aanwezig verplaatsen). Bij maaien onder struiken zo mogelijk een maaihoogte van minstens 15 cm aan houden.
Schonen	-
Baggeren	-
Begrazen	-
Snoeien/dunnen	Controleer of tussen de te verwijderen struiken, boomstronken, struweel en bomen egels voorkomen, indien aanwezig verplaatsen.
Onderhoud waterkeringen	-
Onderhoud verhardingen	-

Ruimtelijke ontwikkelingen & inrichting (vrijstelling)

Vorbereiding van nieuwe werken	-
Verwijderen bovengrond/ graafwerkzaamheden	Controle van bladhopen, (ruige) vegetatie en dode takken op egels. Aangetroffen egels verplaatsen naar de dichtstbijzijnde geschikte plek.
Sloop kunstwerken en gebouwen	-
Bouwactiviteiten	-
Afdammen/dempen/vergraven	-
Leefgebied	In loofbossen met voldoende ondergroei, bosranden, struwelen, hagen, houtwallen, hoge begroeiingen, overhoekjes en graslanden. Voldoende dekking is van groot belang. Hij leeft vaak in de buurt van mensen en wordt daardoor ook veel in tuinen waargenomen. De bodem moet niet te drassig zijn.
Gebruik van het leefgebied	Vrouwtjes hebben een leefgebied van enkele hectaren en leggen gemiddeld per nacht 500 tot 1000 meter af. Mannetjes hebben een groter leefgebied, tot 30 hectare. Zij leggen per nacht grotere afstanden af, met name in de voortplantingstijd. In het leefgebied hebben de egels meerdere slaapplekken: nesten van bladeren of zelf gegraven of verlaten holen.
Voornaamste voedselbronnen	Ongewervelde dieren, eieren, jonge vogeltjes, muizen, kikkers, hagedissen, slangen en kleine hoeveelheden plantaardig voedsel.

Vervolg: zie pagina 2



Vervolg

Egel *Erinaceus europaeus*

Leefwijze door het jaar heen	Vooral in de schemer en 's nacht actief. Vanaf april tot in oktober planten egels zich voort. Jonge egels zijn na anderhalve maand zelfstandig. Volwassen egels gaan eind november in winterslaap en ontwaken in april. De winterslaap wordt regelmatig onderbroken. Egels die laat in het seizoen geboren zijn, blijven tot na nieuwjaar actief, zelfs bij temperaturen rond het vriespunt. Deze jonge egels zijn ook overdag actief en slapen met hun nestgenoten tot ze ruim 300 gram wegen.
Aanbevelingen	<ul style="list-style-type: none">- Handhaaf rommelhoekjes, hagen, houtwallen, geriefhoutbosjes en andere schuilgelegenheden.- Aanleg van faunapassages onder wegen (deze zijn ongeschikt indien deze dagelijks door dassen gebruikt worden).- Plaatsen waarop werkzaamheden als grondverzet of opruiming van ruige begroeiingen, bladhopen plaatsvindt, eerst controleren op het voorkomen van egels en aangetroffen egels verplaatsen.
Belang waterschapspopulaties	Ondergeschikt belang
Verspreiding binnen Nederland	Verspreid over heel Nederland
Rode lijst	-
Beschermingsstatus	
Habitatrichtlijn	-
FF-wet	Tabel 1
Bronnen	Lange <i>et al.</i> , 2004. Van Halm, 1992. Verkem <i>et al.</i> , 2003. Websites: www.minlnv.nederlandsesoorten.nl