



Eider *Somateria mollissima*



Grote, zwaargebouwde eend met een lange wigvormige snavel. Een volwassen mannetje is grotendeels wit met zwarte flanken. Een volwassen vrouwtje is geheel bruin gebandeerd.

Foto: Rombout van Eekelen



- soort niet broedend
- mogelijk broedgeval
- broedgeval waarschijnlijk/zeker

Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec

Groen: Werkzaamheden mogelijk. Oranje: Werkzaamheden mogelijk: ja, mits na overleg met ecooloog en eventuele mitigerende maatregelen. Rood: Werkzaamheden mogelijk: nee, tenzij toestemming van de ecooloog en mitigerende maatregelen worden genomen.

Bestendig beheer en onderhoud (vrijstelling, mits gebruik gedragscode)

Maaien	Zie gedragscode, aanvullend: Waar de soort (mogelijk) broedt alleen in de periode van half september t/m maart. De eider broedt bij zee op de grond tussen grassen, onder struweel, op kwelders en in duinen.
Schonen	Zie gedragscode, aanvullend: Als onder maaien.
Baggeren	Zie gedragscode, aanvullend: Als onder maaien.
Snoeien/dunnen	-
Onderhoud waterkeringen	-
Onderhoud verhardingen	-

Ruimtelijke ontwikkelingen & inrichting (vrijstelling, mits gebruik gedragscode)

Vorbereiding van nieuwe werken	Zie gedragscode
Verwijderen bovengrond/ graafwerkzaamheden	Zie gedragscode, aanvullend: Waar de soort (mogelijk) broedt alleen in de periode van half september t/m maart. De eider broedt bij zee op de grond tussen grassen, onder struweel, op kwelders en in duinen.
Slopen kunstwerken/gebouwen	Zie gedragscode, aanvullend: Als onder verwijderen bovengrond.
Bouwactiviteiten	Zie gedragscode, aanvullend: Als onder verwijderen bovengrond.
Afdammen/dempen/vergraven	Zie gedragscode, aanvullend: Als onder verwijderen bovengrond.

Leefgebied	Broedt nabij zeekusten. In de winter in groepen aan de kust.
Gebruik van het leefgebied	Jaarrond te vinden in zoute en brakke wateren. In de ruiperiode (juli-augustus) concentreren vogels zich in de Waddenzee. In de winter talrijker door aanvulling van overwinterende populaties uit de Oostzee.
Voornaamste voedselbronnen	Mossels, kokkels en in mindere mate nonnetjes, alikruiken, strandkrabben en zeesterren.
Leefwijze door het jaar heen	De broedperiode loopt van begin april tot eind augustus. In begin april balts, in midden april-augustus nesten en paren met jongen. Buiten het broedseizoen zijn de vogels in grote groepen te vinden op open zee en in riviermondingen.
Locatie nest	Bij zee op de grond tussen grassen, onder struweel, op kwelders en in duinen.

Vervolg: zie pagina 2



Vervolg

Eider *Somateria mollissima*

Aanbevelingen	- Nesten niet jaarrond beschermd maar door LNV wordt wel inventarisatie van nesten gewenst omdat de nesten wel jaarrond beschermd zijn als zwaarwegende feiten of ecologische omstandigheden dat rechtvaardigen.
Belang waterschapspopulaties	Ondergeschikt belang
Verspreiding binnen Nederland	In Nederland algemeen. Tijdens het broedseizoen voornamelijk in het Waddengebied en in lage dichtheden langs de noordzeekust.
Rode lijst	-
Beschermingsstatus Vogelrichtlijn	Voor deze soort zijn Natura 2000-gebieden aangewezen.
FF-wet	Strengbeschermd, gelijkgesteld aan tabel 3. Niet jaarrond beschermd nest, wel inventarisatie gewenst.
Bronnen	Literatuur: van de Kam <i>et al.</i> 1999; Snow & Perrins, 1998; LNV, 2009; SOVON, 2002. Websites: www.minlnv.nl ; www.nederlandsesoorten.nl ; www.bto.org

