




Tabel 3

Franjestaart *Myotis nattereri*



Kenmerkend voor *Myotis*-soorten: contrast tussen lichte buik en donkere rug. Oren bij franjestaart altijd langer dan breed en lichtbruin, enigszins doorschijnend en vaak aan de top iets opgewipt. Rug rossig grijsbruin. Buik licht beige tot grijswit. Snuit roze. Brede vleugels.

Foto: René Janssen/Buiten-Beeld



- soort niet waargenomen
- soort (recent) waargenomen

3

Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Groen: Werkzaamheden mogelijk. Oranje: Werkzaamheden mogelijk: ja, mits na overleg met ecooloog en eventuele mitigerende maatregelen. Rood: Werkzaamheden mogelijk: nee, tenzij toestemming van de ecooloog en mitigerende maatregelen worden genomen.

Bestendig beheer en onderhoud (vrijstelling mits gebruik gedragscode)

Maaien	-
Schonen	-
Baggeren	-
Begrazen	-
Snoeien/dunnen	Zie gedragscode
Onderhoud waterkeringen	-
Onderhoud verhardingen	-

Ruimtelijke ontwikkelingen & inrichting (ontheffingsplicht)

Vorbereiding van nieuwe werken	Zie gedragscode
Verwijderen bovengrond/ graafwerkzaamheden	-
Sloop kunstwerken en gebouwen	Zie gedragscode, aanvullend: Periode waarin werkzaamheden dienen plaats te vinden: - In geval van zomerverblijfplaats: september t/m april - In geval van winterverblijfplaats: mei t/m augustus Pas nadat is vastgesteld dat de verblijfplaatsen zijn verlaten, kan worden gestart met werkzaamheden.
Bouwactiviteiten	-
Afdammen/dempen/ vergraven wateren	-
Leefgebied	Relatief besloten, waterrijk bosgebied.
Gebruik van het leefgebied	<i>Zomerverblijven:</i> bomen, incidenteel in gebouwen (zolders, schuren). Er wordt een netwerk van verblijfplaatsen bewoond. <i>Winterverblijven:</i> zowel boven- als ondergronds. Onder andere in grotten, kalksteengroeven, bunkers, forten, vestingwerken, oude steenfabrieken, ijs- en kasteelkelders. <i>Foeragegebied:</i> boven water in bossen, in boomlanen, tussen boomkronen. <i>Vliegroutes:</i> lijnvormige landschapselementen (o.a. lanen, paden en bosranden). <i>Paarplaatsen:</i> zie winterverblijven. Jachtgebied in regel binnen straal van 10 km rondom kolonieplaats. Korte afstand tussen winter- en zomerverblijven (max. 90 km).
Voornaamste voedselbronnen	Vliegen en andere insecten, rupsen, spinnen. Vervolg: zie pagina 2



Vervolg

Franjestaart *Myotis nattereri*

Leefwijze door het jaar heen	Leven jaarrond in kolonies. Nachtactief. In zomer leven vrouwtjes in kraamkolonies (ca. 80 dieren). Mannetjes leven zomers apart van de vrouwtjes. Kraamtijd: eind april/begin mei - augustus. Paartijd: najaar/winter. Winterslaap: oktober - maart/april.
Aanbevelingen	<ul style="list-style-type: none">- Vliegrouetes in tact laten door het veiligstellen van opgaande elementen in een gesloten landschap en het (gedeeltelijk) sparen van houtwallen en/of singels.- Veilig stellen van verblijfplaatsen in bomen; beheer van bos en bomen richten op behoud van oude bomen en boomholtes, en op ontstaan van boomholtes.- Herplant van singels, bomenrijen. Fragmentatie opheffen.
Belang waterschapspopulaties	Nationaal belang
Verspreiding binnen Nederland	Schaars. In de winter vooral in de duingebieden, de Utrechtse heuvelrug en de Veluwe (hogere zandgronden). In de zomer duidelijke binding met bos op de hogere zandgronden.
Rode lijst	Kwetsbaar
Beschermingsstatus	
Habitatrichtlijn	Bijlage IV
FF-wet	Tabel 3
Bronnen	Lange <i>et al.</i> 1994; Broekhuizen <i>et al.</i> 1992; Limpens <i>et al.</i> 1997; Websites: www.minlnv.nederlandsesoorten.nl