




Tabel 1

Gewone pad *Bufo bufo*



Middelgrote tot grote pad (tot 8 cm mannetje en 10 cm vrouwtje) met een grote kop en een brede, ronde snuit en een droge wrattige huid. De rug is vrij egaal bruin met grijze, roodbruine of geelbruine variaties.

Foto: Ewoud van der Ploeg



- soort niet waargenomen
- soort (recent) waargenomen

1

Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Voortplantingswater											

Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Landhabitat											

Groen: Werkzaamheden mogelijk. Oranje: Werkzaamheden mogelijk: ja, mits na overleg met ecooloog en eventuele mitigerende maatregelen. Rood: Werkzaamheden mogelijk: nee, tenzij toestemming van de ecooloog en mitigerende maatregelen worden genomen.

Bestendig beheer en onderhoud (vrijstelling)

Maaien	Vanaf augustus. Niet maaien bij regen.
Schonen	Vanaf half juli t/m januari.
Baggeren	Vanaf half juli t/m januari. Afwijkend van de gedragscode wordt aanbevolen om bij sterke aangroei van bagger om de 5 jaar te baggeren.
Begrazen	Poelen geheel of gedeeltelijk uitrasteren.
Snoeien/dunnen	-
Onderhoud waterkeringen	Dijken afdekken van maart t/m september.
Onderhoud verhardingen	Niet strooien boven open amfibieëntunnels.

Ruimtelijke ontwikkelingen & inrichting (vrijstelling)

Vorbereiding van nieuwe werken	-
Verwijderen bovengrond/ graafwerkzaamheden	Van maart t/m september.
Sloop kunstwerken en gebouwen	Van maart t/m september.
Bouwactiviteiten	-
Afdammen/dempen/ vergraven wateren	In waterarme gebieden nieuwe voortplantingswateren binnen 100 meter van het te dempen water aanleggen (vanwege trouw aan voortplantingswater).

Leefgebied
Komt voor in bijna alle landschappen. Voorkeur voor gevarieerde vegetatiestructuren en kleine landschapselementen (houtwallen, bosjes). Voortplantingswateren zijn wateren met een oevervegetatie, soms ook regenplassen, volgelopen karrensporen of zwak brak water.

Gebruik van het leefgebied
Grotendeels op het land. Schuilplaatsen: zelf gegraven holletjes, voegen in muren, holen tussen de wortels van bomen, holtes onder platte stenen, vermolmd hout of puin en ander afval.
De gewone pad overwintert op een diepte van 10-80 cm onder de grond. Soms overwintert hij in kelders en schuren. Voortplanting en ontwikkeling van de larven vindt plaats in het water.

Voornaamste voedselbronnen
Kevers, springstaarten, spinnen, vliegen, mieren en duizendpoten. Larven: algen en larven.

Vervolg: zie pagina 2



Vervolg

Gewone pad *Bufo bufo*

Leefwijze door het jaar heen	Op het land nachtactief en in het water dag- en nachtactief. De larven en pas gemetamorfoseerde dieren zijn dagactief. De padden leven solitair (alleen). Overwintering van oktober/november tot februari/maart. Trek naar het voortplantingswater: in warme lentes en bij hoge luchtvochtigheid al in de tweede helft van februari. De trek is zeer massaal en verloopt volgens vaste routes. Voortplantingsperiode: maart-mei. Periode larven in het water: april-juli.
Aanbevelingen	<ul style="list-style-type: none">- Realisatie paddentunnels en plaatsing paddenschermen.- Afzetten verkeerswegen en overzetacties tijdens de trek.- Realisatie van alternatieve voortplantingswateren.
Belang waterschap	Groot nationaal belang
Verspreiding binnen Nederland	Heel Nederland met uitzondering van enkele Waddeneilanden.
Rode lijst	-
Beschermingsstatus	-
Habitatrichtlijn	-
FF-wet	Tabel 1
Bronnen	Van Diepenbeek en Creemers, 2006; Nöllert.en Nöllert, 2001; Groenveld en Smit, 2001; Scheffer en Cuppen, 2005. Websites: www.minlnv.nederlandsesoorten.nl