




Tabel 1

Gewone bosspitsmuis *Sorex araneus*



Lijkt op tweekleurige bosspitsmuis, maar vacht is driekleurig. Donkerbruine tot zwartbruine bovenzijde, flanken lichter bruin, duidelijk afgezet tegen rugzijde. Buik grijswit met soms zweem van geel en niet duidelijk afgezet tegen flanken.

Foto: Jelger Herder/Buiten-Beeld



- soort niet waargenomen
- soort (recent) waargenomen

1

Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Groen: Werkzaamheden mogelijk. Oranje: Werkzaamheden mogelijk: ja, mits na overleg met ecooloog en eventuele mitigerende maatregelen. Rood: Werkzaamheden mogelijk: nee, tenzij toestemming van de ecooloog en mitigerende maatregelen worden genomen.

Bestendig beheer en onderhoud (vrijstelling)

Maaien	Gefaseerd maaien in ruimte en tijd
Schonen	-
Baggeren	-
Begrazen	-
Snoeien/dunnen	-
Onderhoud waterkeringen	-
Onderhoud verhardingen	-

Ruimtelijke ontwikkelingen & inrichting (vrijstelling)

Vorbereiding van nieuwe werken	-
Verwijderen bovengrond/ graafwerkzaamheden	Gefaseerde uitvoering van de werkzaamheden in ruimte en tijd
Sloop kunstwerken en gebouwen	-
Bouwactiviteiten	Gefaseerde uitvoering van de werkzaamheden in ruimte en tijd
Afdammen/dempen/ vergraven wateren	-

Leefgebied Diverse biotopen met (dichte) bodembedekkende vegetatie. Ruig grasland, bermen, heide, duinen, rietvelden, bossen. Leeft op dezelfde plekken als tweekleurige bosspitsmuis.

Gebruik van het leefgebied Leeft 's winters overwegend ondergronds, in zomer overwegend bovengronds. Nesten worden meestal bovengronds gemaakt. Gangen worden niet door de Gewone bosspitsmuis zelf gegraven, maar er wordt gebruik gemaakt van gangen van andere kleine zoogdieren.

Voornaamste voedselbronnen Kevers, pissebedden, wormen, spinnen, slakken.

Leefwijze door het jaar heen Dag- en nachtactief, met name in avond en voor nacht. Over een etmaal wisselen 10 periodes van activiteit en rust elkaar af. Territoriumgrootte: 400-650 m². Het voortplantingsseizoen loopt van april-augustus. Grote fluctuaties in populatieomvang tussen de jaren.

Aanbevelingen

- Behoud en aanleg van kleine landschapselementen.
- Door maaisel niet af te voeren, maar te verwerken in hopen, worden extra schuilgelegenheden gecreëerd.

Belang waterschapspopulaties Ondergeschikt belang

Verspreiding binnen Nederland Verspreid in heel Nederland. Soort ontbreekt op de Waddeneilanden, m.u.v. Terschelling. Zwaartepunt van de verspreiding ligt in westelijk laag Nederland.

Vervolg: zie pagina 2



Vervolg

Gewone bosspitsmuis *Sorex araneus*

Rode lijst	-
Beschermingsstatus	
Habitatrichtlijn	-
FF-wet	Tabel 1
Bronnen	Lange <i>et al.</i> 1994; Broekhuizen <i>et al.</i> 1992; Website: www.minlnv.nederlandsesoorten.nl