




## Tabel 1

## Gewone vogelmelk *Ornithogalum umbellatum*



Een lage plant met vrij smal lijnvormige bladeren. De bloemen zijn van binnen wit en van buiten groen en zitten in een schermvormige tros.

Foto: Saskia Vleeming



- soort niet aanwezig
- soort (recent) aanwezig

1

Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Groen: Werkzaamheden mogelijk. Oranje: Werkzaamheden mogelijk: ja, mits na overleg met ecooloog en eventuele mitigerende maatregelen. Rood: Werkzaamheden mogelijk: nee, tenzij toestemming van de ecooloog en mitigerende maatregelen worden genomen.

### Bestendig beheer en onderhoud (vrijstelling)

Maaien	Op dijktaf 2 keer per jaar maaien: vanaf half juni en vanaf half september. Maaisel afvoeren.
Schonen	-
Baggeren	-
Begrazen	Extensieve begrazing is gunstig; echter niet in mei, juni (tijdens de bloeitijd).
Snoeien/dunnen	Enkele schaduwgevendende struiken/bomen laten staan.
Onderhoud waterkeringen	Groeiplaatsen ontzien of desnoods plant uitgraven en zo snel mogelijk opnieuw uitplanten, onder begeleiding van een ecooloog
Onderhoud verhardingen	Gladheidsbestrijding met niet schadelijke middelen (de plant is zoutgevoelig).

### Ruimtelijke ontwikkelingen & inrichting (vrijstelling)

Vorbereiding van nieuwe werken	Groeiplaatsen ontzien of desnoods plant uitgraven en zo snel mogelijk opnieuw uitplanten, onder begeleiding van een ecooloog.
Verwijderen bovengrond/graafwerkzaamheden	Groeiplaatsen ontzien of desnoods plant uitgraven en zo snel mogelijk opnieuw uitplanten, onder begeleiding van een ecooloog.
Sloop kunstwerken en gebouwen	-
Bouwactiviteiten	-
Afdammen/dempen/vergraven	-
Groeiplaats	Landplant van vochtige, matig voedselrijke, zandige tot kleiige bodem. Gewone vogelmelk groeit in het bos of in grasland/op dijken. In het bos doorgaans op plekken met enige dynamiek, waardoor de bodem niet oppervlakkig verzuurd als gevolg van humusaccumulatie, bijvoorbeeld langs paden en in overstromingsbossen (echter relatief hoog en zandig). In grasland doorgaans kenmerkend voor het matig voedselrijk glanshaverhooiland. Dikwijls op de schaduw- zijde van dijktaf en op zwaardere bodems.

Leefwijze door het jaar heen

Bloeiperiode: mei-juni. Tijdens de bloei beginnen de bladeren vanaf de top te verdorren. Vaak bevat de plant in zijn eerste levensjaar nog geen blad. In Nederland vermeerdert de plant zich via nevenbollen. De plant overwintert als bolgewas in de grond.

Vervolg: zie pagina 2



## Vervolg

## Gewone vogelmelk *Ornithogalum umbellatum*

Aanbevelingen	- Openhouden van de vegetatie door o.a. 2 keer per jaar maaien, waarmee concurrentiekrachtiger soorten worden teruggedrongen. - Lichte begrazing is gunstig. - In het bos is maaien en begrazen niet nodig.
Verspreiding binnen Nederland	Plaatselijk vrij algemeen tot vrij zeldzaam. De plant verwildert soms vanuit tuinen. De laatste jaren is de soort sterk toegenomen.
Belang waterschapspopulaties	Ondergeschikt belang
Status Rode lijst	-
Beschermingsstatus	
Habitatrichtlijn	-
FF-wet	Tabel 1
Bronnen	Weeda <i>et al.</i> , 2003. Van der Meijden, 2005. Van Looy en De Blust, 1999.