



Grauwe kiekendief *Circus pygargus*



Slanke, middelgrote roofvogel met smalle vleugelbasis. Een volwassen mannetje heeft lichte tot grijze vleugels met contrasterende zwarte vleugeltoppen en donkere lijnen op de onderzijde. Een volwassen vrouwtje heeft een uniform donkere onder- en bovenzijde met contrasterende witte stuit en gebandeerde staart.

Foto's: Bas van den Boogaard/Rein Hofman



Groen: Werkzaamheden mogelijk. Oranje: Werkzaamheden mogelijk: ja, mits na overleg met ecooloog en eventuele mitigerende maatregelen. Rood: Werkzaamheden mogelijk: nee, tenzij toestemming van de ecooloog en mitigerende maatregelen worden genomen.

Bestendig beheer en onderhoud (vrijstelling, mits gebruik gedragscode)

Maaien	Zie gedragscode, aanvullend: Waar de soort (mogelijk) broedt alleen in de periode van half september t/m maart. De grauwe kiekendief maakt het nest op de grond in vegetaties met gras, wintertarwe en/of luzerne.
Schonen	-
Baggeren	-
Snoeien/dunnen	Zie gedragscode, aanvullend: Als onder maaien. Bovendien is het wenselijk om slaappleatslocaties in de winter ongemoeid te laten.
Onderhoud waterkeringen	-
Onderhoud verhardingen	-

Ruimtelijke ontwikkelingen & inrichting (vrijstelling, mits gebruik gedragscode)

Vorbereiding van nieuwe werken	Zie gedragscode
Verwijderen bovengrond/ graafwerkzaamheden	Zie gedragscode, aanvullend: Waar de soort (mogelijk) broedt alleen in de periode van half september t/m maart. De grauwe kiekendief maakt het nest op de grond in gras, wintertarwe en luzerne.
Slopen kunstwerken/gebouwen	Zie gedragscode, aanvullend: Als onder verwijderen bovengrond
Bouwactiviteiten	Zie gedragscode, aanvullend: Als onder verwijderen bovengrond
Afdammen/dempen/vergraven	-
Leefgebied	Broedt in open gebieden als akkers en cultuurgraslanden. In de winter verblijvend in tropisch Afrika.
Gebruik van het leefgebied	In het broedseizoen in uitgestrekte open gebieden met een extensief grondgebruik. Buiten het broedseizoen in Afrika.
Voornaamste voedselbronnen	Kleine zoogdieren, insecten en vogels.
Leefwijze door het jaar heen	De broedperiode loopt van begin mei tot midden september. Vanaf begin mei balts en van midden mei-midden september nesten en paren met jongen. Buiten het broedseizoen zijn de vogels te vinden in gevarieerde open gebieden. In de winter verblijvend in Afrika.
Locatie nest	Op de grond in dichte vegetatie van gras, wintertarwe en/of luzerne. Vervolg: zie pagina 2





Vervolg

Grauwe kiekendief *Circus pygargus*

Aanbevelingen	<ul style="list-style-type: none">- Vermijd betreding en het uitvoeren van werkzaamheden in potentiële broedbiotopen gedurende het broedseizoen.- Maaien en oogsten na het broedseizoen.- Soortgericht beheer. Ondermeer het behouden en stimuleren van grootschalige braaklegging van open landbouwgronden.
Belang waterschapspopulaties	Gering tot matig belang.
Verspreiding binnen Nederland	In Nederland zeldzaam tot zeer plaatselijk algemeen. Tijdens het broedseizoen voornamelijk in Groningen en Flevoland.
Rode lijst	Ernstig bedreigd.
Beschermingsstatus Vogelrichtlijn	Voor deze soort zijn Natura 2000-gebieden aangewezen.
FF-wet	Strengbeschermd, gelijkgesteld aan tabel 3
Bronnen	Literatuur: Bijlsma <i>et al.</i> , 2003; den Boer <i>et al.</i> , 2000; LNV, 2009; Snow & Perrins, 1998; SOVON, 2002. Websites: www.minlnv.nl ; www.nederlandsesoorten.nl ; www.bto.org

