



Tabel 2

Grote bosmuis *Apodemus flavicollis*



Lijkt op bosmuis. Rugzijde geel- tot roodbruin. Scherpe scheiding tussen bruine rugzijde en witte buikzijde. Hals met doorlopende gelige band / vlekken. Halsvlek loopt nooit door over de buik zoals bij bosmuis. Grote bosmuis gemiddeld 1,5 keer zo zwaar als bosmuis.

Foto: Jelger Herder/Buiten-Beeld



- soort niet waargenomen
- soort (recent) waargenomen

2

Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Groen: Werkzaamheden mogelijk. Oranje: Werkzaamheden mogelijk: ja, mits na overleg met ecooloog en eventuele mitigerende maatregelen. Rood: Werkzaamheden mogelijk: nee, tenzij toestemming van de ecooloog en mitigerende maatregelen worden genomen.

Bestendig beheer en onderhoud (vrijstelling, mits gebruik gedragscode)

Maaien	Zie gedragscode, aanvullend: Gefaseerd maaien in ruimte en tijd.
Schonen	-
Baggeren	-
Begrazen	-
Snoeien/dunnen	Zie gedragscode
Onderhoud waterkeringen	-
Onderhoud verhardingen	-

Ruimtelijke ontwikkeling en inrichting (vrijstelling, mits gebruik gedragscode)

Vorbereiding van nieuwe werken	-
Verwijderen bovengrond/ graafwerkzaamheden	Zie gedragscode, aanvullend: In oktober/november en gefaseerde uitvoering van de werkzaamheden in ruimte en tijd.
Sloop kunstwerken en gebouwen	-
Bouwactiviteiten	-
Afdammen/dempen/ vergraven wateren	-
Leefgebied	Vooraf in oude en open eiken- en beukenbossen met uitgebreide struiklaag en weinig ontwikkelde ondergroei.
Gebruik van het leefgebied	Vergelijkbaar met bosmuis. Graven zelden zelf hol, maar maken gebruik van bestaande hopen van o.a. mol, konijn, woelmuizen. Maken nesten van bladeren en mos, vaak ondergronds. Komen ook voor langs water.
Voornaamste voedselbronnen	Alleseter. Vergelijkbaar met bosmuis, maar relatief meer boomzaden dan graszaden. Plantendelen, zaden, granen, vruchten, noten, spinnen, insecten, slakken, eieren, wormen.
Leefwijze door het jaar heen	Vergelijkbaar met bosmuis. Nachtactief. Sociale structuur is onduidelijk, mogelijk polygaam. Verplaatsingen beperkt tot ca. 1 km. Voortplantingsperiode: maart-oktober. Dichtheden doorgaans 1-60 per ha. Geen grote populatieschommelingen.
Aanbevelingen	- Behoud en aanleg van kleine landschapselementen. - Door maaisel niet af te voeren, maar te verwerken in hopen, worden extra schuilgelegenheden gecreëerd. - Aanplanten of handhaven van bes- of noten-dragende planten.
Belang waterschapspopulaties	Ondergeschikt belang Vervolg: zie pagina 2



Vervolg

Grote bosmuis *Apodemus flavicollis*

Verspreiding binnen Nederland Zeer zeldzaam. Recente waarnemingen zijn bekend van Zuid-Limburg (langs de Gulp bij Gulpen, langs de Cottesserbeek en de Klitserbeek bij Bommerig) en Winterswijk. Is in Limburg waarschijnlijk algemener dan wordt verondersteld.

Rode lijst Gevoelig

Beschermingsstatus

Habitatrichtlijn -

FF-wet Tabel 2

Bronnen Lange *et al.* 1994; Broekhuizen *et al.* 1992;
Websites: www.minlnv.nederlandsesoorten.nl;
www.vzz.nl