



Grote Gele Kwikstaart *Motacilla cinerea*



Slanke, kleine zangvogel met een zeer lange staart. Bovenzijde grijs, onderzijde witgeel. De stuit is groengeel.

Foto: Natalia Paklina/Buiten-Beeld

Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Groen: Werkzaamheden mogelijk. Oranje: Werkzaamheden mogelijk: ja, mits na overleg met ecooloog en eventuele mitigerende maatregelen. Rood: Werkzaamheden mogelijk: nee, tenzij toestemming van de ecooloog en mitigerende maatregelen worden genomen.

Bestendig beheer en onderhoud (vrijstelling, mits gebruik gedragscode)

Maaien

Zie gedragscode, aanvullend: Nesten zijn jaarrond beschermd. Waar de soort (mogelijk) broedt alleen in de periode van september tot half maart. De grote gele kwikstaart broedt in uitsparingen in muren en oevertaluds, holle ruimten onder bruggen, in duikers, achter sluisdeuren, holten tussen boomwortels.

Schonen

Zie gedragscode, aanvullend: Als onder maaien omdat nesten zich op oevers, tot tegen de waterlijn aan, kunnen bevinden.

Baggeren

Zie gedragscode, aanvullend: Als onder maaien.

Snoeien/dunnen

Zie gedragscode, aanvullend: Als onder maaien.

Onderhoud waterkeringen

Zie gedragscode, aanvullend: Nesten zijn jaarrond beschermd. De soort broedt o.a. in sluiscomplexen (spleten in de kade e.d).

Onderhoud verhardingen

Zie gedragscode, aanvullend: Als onder maaien.

Ruimtelijke ontwikkeling en inrichting (vrijstelling, mits gebruik gedragscode)

Vorbereiding van nieuwe werken

Zie gedragscode

Buiten de broedperiode kan een (potentiële) nestplaats ongeschikt worden gemaakt. Omdat de grote gele kwikstaart van kleine ruimten gebruik kan maken als nestplaats, verdient het aanbeveling om een ter zake kundige de situatie te laten beoordelen.

Verwijderen bovengrond/
graafwerkzaamheden

Zie gedragscode, aanvullend: Waar de soort (mogelijk) broedt alleen in de periode van september tot half maart. De grote gele kwikstaart broedt in o.a. in uitsparingen in oevertaluds, holle ruimten onder bruggen en tussen boomwortels.

Sloop kunstwerken en gebouwen

Zie gedragscode, aanvullend: Als onder maaien omdat grote gele kwikstaarten regelmatig broeden op en rond gebouwen en onder bruggen en viaducten.

Bouwactiviteiten

Zie gedragscode

Als onder verwijderen bovengrond

Afdammen/dempen/vergraven


Zie gedragscode, aanvullend:

Als onder verwijderen bovengrond.

Leefgebied

Sterk gebonden aan water, met name beken en snelstromende rivieren. Vaker te vinden langs wateren in structuurrijke gebieden (bosbeken, waterpartijen op landgoederen) en bebouwd gebied (sluizen, bruggen, waterzuiveringen etc.) dan in open gebieden. Ook wel langs kanalen en meren.

Vervolg: zie pagina 2



- soort niet broedend
- mogelijk broedgeval
- broedgeval waarschijnlijk/zeker





Vervolg

Grote Gele Kwikstaart *Motacilla cinerea*

Gebruik van het leefgebied	Zoekt voedsel langs de oevers van watergangen en in de winter ook op platte daken in steden, langs eendenvijvers e.d. Rust vaak op stenen langs de oever en slaapt in overhangende takken boven het water. In Nederland als broedvogel vaak afhankelijk van kunstwerken en gebouwen aan het water.
Voornaamste voedselbronnen	Insecten.
Leefwijze door het jaar heen	De broedperiode loopt van eind maart tot in augustus. Eieren en nesten met jongen vooral tot eind mei. Vliegvlugge jongen in de buurt van de nestlocatie tot diep in augustus. Oudervogels verblijven jaarrond min of meer op de broedlocaties. Tevens doortrekker en wintergast vanuit Scandinavië.
Locatie nest	Uitsparingen in muren en oevertaluds, holle ruimten onder bruggen, in duikers, achter sluisdeuren, holten tussen boomwortels, etc. Accepteert nestkasten.
Aanbevelingen	<ul style="list-style-type: none">- Let op: nesten zijn jaarrond beschermd.- Handhaven en bevorderen van natuurlijke beeklopen.- Ophangen van nestkasten aan kunstwerken (bruggen, sluiscomplexen, gemalen etc.) indien natuurlijke en kunstmatige holten ontbreken.- Handhaven en bevorderen van de waterkwaliteit en behoefte van de macrofauna (voedsel).
Belang Waterschapspopulaties	Groot nationaal belang.
Verspreiding binnen Nederland	Schaarse broedvogel in Twente, de Achterhoek, Limburg en langs de randen van de Veluwe. Verspreiding valt grotendeels samen met de aanwezigheid van beeksystemen. In de trekperiode en de winter algemener en meer verspreid over heel Nederland.
Rode lijst 2004	-
Beschermingsstatus Vogelrichtlijn	Voor deze soort zijn geen Natura 2000-gebieden aangewezen.
FF-wet	Strengbeschermd, gelijkgesteld aan tabel 3. Jaarrond beschermd nest.
Bronnen	Literatuur: Bijlsma <i>et al.</i> 2001, Snow & Perrins 1998, SOVON 2002. Websites: www.minlnv.nl , www.nederlandsesoorten.nl .

