



Grutto *Limosa limosa*



Vrij grote steltloper met lange poten en een lange, iets opgewipte oranje snavel. Bovenzijde grijs met witte stuit en witte vleugelvlekken. Onderzijde met gebandeerde buik en vooral bij de mannetjes een oranje borst.

Foto: Christophe Brochard



- soort niet broedend
- mogelijk broedgeval
- broedgeval waarschijnlijk/zeker

Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec

Groen: Werkzaamheden mogelijk. Oranje: Werkzaamheden mogelijk: ja, mits na overleg met ecooloog en eventuele mitigerende maatregelen. Rood: Werkzaamheden mogelijk: nee, tenzij toestemming van de ecooloog en mitigerende maatregelen worden genomen.

Bestendig beheer en onderhoud (vrijstelling, mits gebruik gedragscode)

Maaien	Zie gedragscode, aanvullend: Waar de soort (mogelijk) broedt alleen in de periode van augustus t/m maart. De grutto broedt op de grond, verscholen in lage tot middelhoge vegetatie.
Schonen	Zie gedragscode, aanvullend: Als onder maaien.
Baggeren	Zie gedragscode, aanvullend: Als onder maaien.
Snoeien/dunnen	-
Onderhoud waterkeringen	-
Onderhoud verhardingen	-

Ruimtelijke ontwikkelingen & inrichting (vrijstelling, mits gebruik gedragscode)

Vorbereiding van nieuwe werken	Zie gedragscode
Verwijderen bovengrond/graafwerkzaamheden	Zie gedragscode, aanvullend: Waar de soort (mogelijk) broedt alleen in de periode van augustus t/m maart. De grutto broedt op de grond, verscholen in lage tot middelhoge vegetatie.
Slopen kunstwerken/gebouwen	Zie gedragscode, aanvullend: Als onder verwijderen bovengrond.
Bouwactiviteiten	Zie gedragscode, aanvullend: Als onder verwijderen bovengrond.
Afdammen/dempen/vergraven	Zie gedragscode, aanvullend: Als onder verwijderen bovengrond.
Leefgebied	Broedt in natte, open graslanden met een korte, tot middelhoge vegetatie. In de winter verblijvend in Zuid-Europa en Afrika.
Gebruik van het leefgebied	In het broedseizoen in open weidegebieden met een lage tot middelhoge vegetatie. Buiten het broedseizoen op trek voornamelijk in waterrijke gebieden met een geringe waterdiepte. In de winter verblijvend in Zuid-Europa en Afrika.
Voornaamste voedselbronnen	Hoofdzakelijk ongewervelden.
Leefwijze door het jaar heen	De broedperiode loopt van begin april tot eind juli. Vanaf begin april balts en van midden april-eind juli nesten en paren met jongen. Buiten het broedseizoen verblijven de vogels in moerasgebieden in Zuid-Europa en Afrika.
Locatie nest	Nest op de grond, verscholen in lage tot middelhoge vegetatie.



Vervolg: zie pagina 2



Vervolg

Grutto *Limosa limosa*

Aanbevelingen	<ul style="list-style-type: none">- Vermijd wijzigingen van het waterpeil binnen de voortplantingsperiode.- Beheer van veenweide gebieden extensiveren (minder en later maaien, beweiden en bemesten).- Vermijd betreding en het uitvoeren van werkzaamheden in potentiële broedbiotopen gedurende het broedseizoen.
Belang waterschapspopulaties	Groot internationaal belang
Verspreiding binnen Nederland	In Nederland algemeen, maar afnemend. Tijdens het broedseizoen voornamelijk in hogere dichtheden in Friesland, Noord-Holland, Zuid-Holland en Noordwest-Overijssel.
Rode lijst	Gevoelig
Beschermingsstatus Vogelrichtlijn	Voor deze soort zijn Natura 2000-gebieden aangewezen.
FF-wet	Strengbeschermd, gelijkgesteld aan tabel 3
Bronnen	Literatuur: van de Kam <i>et al.</i> 1999; LNV, 2009; Snow & Perrins, 1998; SOVON, 2002. Websites: www.minlnv.nl ; www.nederlandsesoorten.nl ; www.bto.org

