




Tabel 2



Lage plant met behaarde stengel en langwerpige bladeren. De bladeren zijn kleiner, ronder en donkerder groen dan die van de stengelloze sleutelbloem. De bloemen zijn donkergeel met oranje vlekken en zitten in groepjes bij elkaar.
Foto: Ewoud van der Ploeg



- soort niet aanwezig
- soort (recent) aanwezig

2

Gulden sleutelbloem *Primula veris*

Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec

Groen: Werkzaamheden mogelijk. Oranje: Werkzaamheden mogelijk: ja, mits na overleg met ecooloog en eventuele mitigerende maatregelen. Rood: Werkzaamheden mogelijk: nee, tenzij toestemming van de ecooloog en mitigerende maatregelen worden genomen.

Bestendig beheer en onderhoud (vrijstelling, mits gebruik gedragscode)

Maaien	Zie gedragscode, aanvullend: Bij voorkeur 2 keer per jaar maaien: vanaf half juni en vanaf half september. Maaisel afvoeren.
Schonen	Zie gedragscode
Baggeren	Zie gedragscode
Begrazen	Zie gedragscode, aanvullend: Extensieve begrazing tijdens bloeiperiode (april-juni). Vanaf half juli is intensiever graasbeheer mogelijk.
Snoeien/dunnen	Zie gedragscode, aanvullend: Enkele struiken/bomen laten staan.
Onderhoud waterkeringen	Zie gedragscode
Onderhoud verhardingen	Zie gedragscode

Ruimtelijke ontwikkelingen & inrichting (vrijstelling, mits gebruik gedragscode)

Vorbereiding van nieuwe werken	Zie gedragscode
Verwijderen bovengrond/ graafwerkzaamheden	Zie gedragscode
Sloop kunstwerken en gebouwen	-
Bouwactiviteiten	-
Afdammen/dempen/vergraven	-
Groeiplaats	Landplant. Gulden sleutelbloem groeit op vochtige, humushoudende, meestal kalkrijke grond. De plant verdraagt geen zware beschaduwning. De plant is kenmerkend voor matig voedselrijk glanshaverhoiland en kamgrasweiden.
Leefwijze door het jaar heen	Bloeiperiode: april-juni. Vanaf mei tot juli vormt de plant zaad. De zaden worden verspreid via harde wind en via mieren. De zaden blijven zelden langer dan een jaar kiemkrachtig. De knopen overwinteren net boven of net onder de grond.

Aanbevelingen

- Tegengaan verdroging en vermijden lage waterpeilen.
- Aangepast graasbeheer. Begrazing vanaf half mei leidt tot een geringere bloei en een beperktere zaadproductie. Begrazing vanaf midden juli leidt tot meer bloei, voldoende zaadzetting en verjonging.
- Kort houden van de vegetatie door o.a. 2 keer per jaar maaien, waarmee concurrentiekrachtigere soorten worden teruggedrongen.

Vervolg: zie pagina 2



Vervolg

Gulden sleutelbloem *Primula veris*

Belang waterschapspopulaties	Nationaal belang
Verspreiding binnen Nederland	Op Zuid-Limburgse hellingen en langs rivieren en beken in Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Utrecht. Daarbuiten mogelijk verwilderde exemplaren uit tuinen of aangeplant.
Status Rode lijst	Kwetsbaar
Beschermingsstatus	
Habitatrichtlijn	-
FF-wet	Tabel 2
Bronnen	Weeda, <i>et al.</i> , 1988. Van der Meijden, 2005. Dumortier <i>et al.</i> , 2005. Van Looy en De Blust, 1999. Websites: www.soortendatabank.nl ; www.wilde-planten.nl