




Tabel 1

Haas *Lepus europaeus*



Lijkt op konijn maar is forser, heeft grotere poten en langere oren dan konijn. Grijs- of geelbruine rugvacht, witte buik en bleekgele wangen.

Foto: Martin Bonte/Bureau Waardenburg



- soort niet waargenomen
- soort (recent) waargenomen

1

Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Groen: Werkzaamheden mogelijk. Oranje: Werkzaamheden mogelijk: ja, mits na overleg met ecooloog en eventuele mitigerende maatregelen. Rood: Werkzaamheden mogelijk: nee, tenzij toestemming van de ecooloog en mitigerende maatregelen worden genomen.

Bestendig beheer en onderhoud (vrijstelling)

Maaien	Gefaseerd maaien in ruimte en tijd. Maaien bij voorkeur met wildredder.
Schonen	-
Baggeren	-
Begrazen	-
Snoeien/dunnen	Werkzaamheden rondom burchtlocaties bij voorkeur uitvoeren in de periode augustus t/m november.
Onderhoud waterkeringen	-
Onderhoud verhardingen	-

Ruimtelijke ontwikkeling en inrichting (vrijstelling)

Vorbereiding van nieuwe werken	-
Verwijderen bovengrond/ graafwerkzaamheden	Gefaseerde uitvoering van de werkzaamheden in ruimte en tijd. Zorgvuldig te werk gaan, dieren mogelijkheid geven om te vluchten.
Sloop kunstwerken en gebouwen	-
Bouwactiviteiten	Gefaseerde uitvoering van de werkzaamheden in ruimte en tijd. Zorgvuldig te werk gaan, dieren mogelijkheid geven om te vluchten.
Afdammen/dempen/ vergraven wateren	-
Leefgebied	Gras- en akkerland; met name kleinschalige landbouwgebieden met afwisselende gewassen.
Gebruik van het leefgebied	Kleine landschapselementen als bosranden, ruigte-zomen en heggen dienen als rustplaats, vooral in de winter. Ook in hoger gras en tussen kluiten van geploegde akkers.
Voornaamste voedselbronnen	Gras (winter), kruiden (zomer) en akkerbouwproducten (o.a. graan, maïs).
Leefwijze door het jaar heen	Solitaire leefwijze. Jaarrond actief, overwegend in de vooravond en 's nachts; in de zomer ook overdag. Sterk plaatsgebonden. Voortplantingsseizoen: december–augustus. Grote fluctuaties in populatie-omvang tussen de jaren. Dichtheden variëren afhankelijk van plaats en seizoen van enkele tot 150 dieren per km ² . Eveneens grote fluctuaties tussen de jaren, vooral o.i.v. het weer.
Aanbevelingen	-
Belang waterschapspopulaties	Ondergeschikt belang
Verspreiding binnen Nederland	Algemeen. Verspreid in heel Nederland.
Rode lijst	-

Vervolg: zie pagina 2



Vervolg

Haas *Lepus europaeus*

Beschermingsstatus

Habitatrichtlijn

-

FF-wet

Tabel 1

Bronnen

Lange *et al.* 1994; Broekhuizen *et al.* 1992;
Websites: www.minlnv.nederlandsesoorten.nl;
www.vzz.nl