



Tabel 1

Hermelijn *Mustela erminea*



Kleine marterachtige met een lang, smal lichaam, korte poten en rechtopstaande oren. De mannetjes zijn twee keer zo groot als de vrouwtjes. De rug is bruin en de buik wit. In de winter kan de vacht geheel of gedeeltelijk wit worden. De staartpunt blijft zwart. Te onderscheiden van de wezel door de langere en zwaarder behaarde staart met een zwarte punt.

Foto: Beate Ludwig/Buiten-Beeld



- soort niet waargenomen
- soort (recent) waargenomen

1

Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Groen: Werkzaamheden mogelijk. Oranje: Werkzaamheden mogelijk: ja, mits na overleg met ecooloog en eventuele mitigerende maatregelen. Rood: Werkzaamheden mogelijk: nee, tenzij toestemming van de ecooloog en mitigerende maatregelen worden genomen.

Bestendig beheer en onderhoud (vrijstelling)

Maaien	Minimaal 25% van de vegetatie sparen; maaisel in hopen verwerken.
Schonen	-
Baggeren	-
Begrazen	-
Snoeien/dunnen	-
Onderhoud waterkeringen	-
Onderhoud verhardingen	-

Ruimtelijke ontwikkelingen & inrichting (vrijstelling)

Vorbereiding van nieuwe werken	-
Verwijderen bovengrond/ graafwerkzaamheden	-
Sloop kunstwerken en gebouwen	-
Bouwactiviteiten	Van juni t/m maart.
Afdammen/dempen/ vergraven wateren	-

Leefgebied
Kleinschalige landschappen met kleine landschapselementen waarin voldoende voedsel en dekking aanwezig is. Hermelijnen leven vaak op de randzone van een terrein (perceelsranden, taluds, oevers, houtwallen, heggen). Ze hebben een voorkeur voor vochtige terreinen als rietvelden, moerassen, broekbossen.

Gebruik van het leefgebied
De grootte van het leefgebied ligt tussen de 4 en 50 hectare. De mannetjes hebben een drie- tot viermaal zo groot leefgebied als de vrouwtjes. Schuilplaatsen zijn houtstapels, dichte begroeiingen, boomwortels, oude hopen van konijnen en ratten, oeverholten en boomholten. De holten moeten groter zijn dan 5 cm in doorsnede.

Hermelijnen jagen vanuit schuilgelegenheden op prooien en kunnen daarbij goed zwemmen en klimmen.

Voornaamste voedselbronnen
Kleine knaagdieren, met name woelmuizen, woelratten, konijnen en jonge hazen. Daarnaast kleine vogels en eieren. In de winter soms pluimvee.

Vervolg: zie pagina 2



Vervolg

Hermelijn *Mustela erminea*

Leefwijze door het jaar heen	Vooral 's nachts, soms overdag actief, met name de vrouwtjes met jongen. In de winter is de hermelijn slechts een paar uur per nacht actief. De paartijd loopt van maart tot juni. In het jaar daarop worden in april of mei de jongen geboren; meestal 4 tot 8 jongen per worp. Het vrouwtje zorgt alleen voor de jongen.
Aanbevelingen	<ul style="list-style-type: none">- Behoud en aanleg van kleine landschapselementen.- Gefaseerd maaien van hooilanden en rietkragen, zodat voldoende vegetatie blijft staan voor schuilgelegenheid. Door het maaisel niet af te voeren, maar te verwerken in hopen, worden extra schuilgelegenheden gecreëerd.- Aanleg van natuurvriendelijke oevers.- In open landschappen: schuilhopen opwerpen of marterkasten plaatsen.- (Verzoek om) toepassing van alternatieve vangtechnieken dan klemmen bij de muskusrattenbestrijding.
Belang waterschapspopulaties	Groot nationaal belang
Verspreiding binnen Nederland	Verspreid over het vaste land, daarnaast op Terschelling en Texel.
Rode lijst	Gevoelig
Beschermingsstatus	
Habitatrichtlijn	-
FF-wet	Tabel 1
Bronnen	Lange <i>et al.</i> , 2004. Bode <i>et al.</i> , 1999. Jonker en Mulder, 1994