




Tabel 2

Hondskruid *Anacamptis pyramidalis*



Lage, soms middelhoge orchidee. De vlezige bladeren staan schuin omhoog en beginnen niet vanuit dezelfde plaats aan de stengel. De bladeren zijn smal en vaak talrijk. De onderste bladeren komen al in de herfst boven en verdorren voor of tijdens de bloei.

Foto: Floris Brekelmans/
Bureau Waardenburg



- soort niet aanwezig
- soort (recent) aanwezig

2

Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Groen: Werkzaamheden mogelijk. Oranje: Werkzaamheden mogelijk: ja, mits na overleg met ecooloog en eventuele mitigerende maatregelen. Rood: Werkzaamheden mogelijk: nee, tenzij toestemming van de ecooloog en mitigerende maatregelen worden genomen.

Bestendig beheer en onderhoud (vrijstelling, mits gebruik gedragscode)

Maaien	Zie gedragscode, aanvullend: Maaien vanaf augustus. Maaisel afvoeren.
Schonen	Zie gedragscode
Schonen vanaf augustus.	
Baggeren	Zie gedragscode
Begrazen	Zie gedragscode
Snoeien/dunnen	Zie gedragscode, aanvullend: Bij voorkeur bomen en struiken verwijderen op geschikte groeiplaatsen (kalkrijke duinen nabij zeedorpen).
Onderhoud waterkeringen	Zie gedragscode, aanvullend: Groeiplaatsen ontzien of desnoods plant met bodem uitgraven en zo snel mogelijk overzetten op een geschikte locatie, onder begeleiding van een deskundige.
Onderhoud verhardingen	Zie gedragscode

Ruimtelijke ontwikkelingen & inrichting (vrijstelling, mits gebruik gedragscode)

Vorbereiding van nieuwe werken	Zie gedragscode
Verwijderen bovengrond/ graafwerkzaamheden	Zie gedragscode, aanvullend: Groeiplaatsen ontzien of desnoods plant met bodem uitgraven en zo snel mogelijk overzetten op een geschikte locatie, onder begeleiding van een deskundige.
Sloop kunstwerken en gebouwen	-
Bouwactiviteiten	-
Afdammen/dempen/vergraven	-
Groeiplaats	Landplant. Groeit op zonnige tot licht beschaduwde, droge plaatsen, op lichte, kalkrijke humushoudende grond, in schraal (duin)grasland of in een ijle begroeiing van Dauwbraam, vaak op noordhellingen (relatief vochtig microklimaat). De Nederlandse groeiplaatsen in de vastelandsduinen kennen een lange geschiedenis van menselijke beïnvloeding. Met name beweiding heeft bijgedragen tot het ontstaan van het type grasland waarin hondskruid voorkomt. Er lijkt daar een verband te zijn tussen het staken van begrazing en het verdwijnen van hondskruid. Te intensieve begrazing is echter eveneens nadelig voor deze soort.

Vervolg: zie pagina 2



Vervolg

Hondskruid *Anacamptis pyramidalis*

Leefwijze door het jaar heen	Vaatplant, overblijvend (meerjarig). Bloeiperiode: juni-juli. Verspreiding van zaad door wind in juli-augustus. Bovengrondse delen sterven in de winter af. De aantallen bloeiende exemplaren kunnen van jaar tot jaar uitzonderlijk sterk wisselen.
Aanbevelingen	<ul style="list-style-type: none">- Maatregelen om vergrassing, struweelvorming en verruiging met dauwbraam tegen te gaan. Bij voorkeur door een combinatie van extensieve begrazing, konijnenbegrazing en betreding, indien nodig aangevuld met maaibeheer.- Sterke erosie op steile groeiplaatsen tegengaan indien nodig.- Struweel en bos verwijderen op potentieel geschikte groeiplaatsen (kalkrijke duinen nabij zeedorpen).
Belang Waterschapspopulaties	Ondergeschikt belang
Verspreiding binnen Nederland	Zwaartepunt van voorkomen is in de kalkrijke duinen. Er zijn daar enkele bestendige groeiplekken. Sinds enkele jaren zijn er nieuwe vindplaatsen bijgekomen buiten de duinen, in wegbermen, opgespoten zandvlakten in het westelijk deel van het land. De recente uitbreiding binnen en buiten de duinen is mogelijk het gevolg van de zachte winters van de laatste jaren. Op de Zuidlimburgse krijthellingen is de soort zeldzaam.
Status Rode lijst	Gevoelig
Beschermingsstatus	-
Habitatrichtlijn	-
FF-wet	Tabel 2
Bronnen	Kreutz & Dekker, 2000. Weeda <i>et al.</i> , 2003. Websites: www.minlnv.nederlandsesoorten.nl ; www.soortenbank.nl