




Tabel 2

Honingorchis *Herminium monorchis*



(Zeer) lage plant. De orchidee heeft aan de voet twee grote, meestal langwerpige bladeren, en vaak bovenaan de bloeistengel een heel klein blaadje. De bloemetjes zijn groen-geel, buigen voorover en staan meestal aan één kant van de aar. De bloemetjes ruiken naar honing.

Foto: Christophe Brochard



- soort niet aanwezig
- soort (recent) aanwezig

2

Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Groen: Werkzaamheden mogelijk. Oranje: Werkzaamheden mogelijk: ja, mits na overleg met ecooloog en eventuele mitigerende maatregelen. Rood: Werkzaamheden mogelijk: nee, tenzij toestemming van de ecooloog en mitigerende maatregelen worden genomen.

Bestendig beheer en onderhoud (vrijstelling, mits gebruik gedragscode)

Maaien	Zie gedragscode, aanvullend: Maaien vanaf augustus, bij voorkeur vanaf september. Maaisel afvoeren.
Schonen	Zie gedragscode
Baggeren	Zie gedragscode
Begrazen	Zie gedragscode
Snoeien/dunnen	Zie gedragscode
Onderhoud waterkeringen	Zie gedragscode, aanvullend: Groeiplaatsen ontzien of desnoods plant met bodem uitgraven en zo snel mogelijk overzetten op een geschikte locatie, onder begeleiding van een deskundige.
Onderhoud verhardingen	Zie gedragscode

Ruimtelijke ontwikkelingen & inrichting (vrijstelling, mist gebruik gedragscode)

Vorbereiding van nieuwe werken	Zie gedragscode
Verwijderen bovengrond/ graafwerkzaamheden	Zie gedragscode, aanvullend: Groeiplaatsen ontzien of desnoods plant met bodem uitgraven en zo snel mogelijk overzetten op een geschikte locatie, onder begeleiding van een deskundige.
Sloop kunstwerken en gebouwen	-
Bouwactiviteiten	-
Afdammen/dempen/vergraven	-
Groeiplaats	Landplant. De plant groeit op niet zure, humeuze, vochtige bodem met lage, open grazige begroeiing. Groeit in kalkrijke duinvaleien, zelden op noordhellingen en bomtrechters in kalkrijke duinen. De beste plaatsen hebben geen direct zonlicht maar zijn niet donker. Voor de kieming is vers blootgelegd kalkhoudend zand of krijt nodig.

Leefwijze door het jaar heen
 Vaatplant, overblijvend (meerjarig). Bovengrondse delen sterven af in de winter. Bloeiperiode: juni-juli. Bronswespen zijn de belangrijkste bestuivers. Zaadverbreiding m.b.v. wind in juli-augustus. De orchidee heeft voor de bloei 1 wortelknol, na de bloei vormen zich nieuwe knollen aan witte uitlopers.

Vervolg: zie pagina 2



Vervolg

Honingorchis *Herminium monorchis*

Aanbevelingen	<ul style="list-style-type: none">- Optimalisatie hydrologie: niet te droog, maar ook niet te nat, tegengaan verzuring (invloed kalkrijk grondwater stimuleren)- Tegengaan van verzuiging van de groeiplaatsen, eventueel door maaibeheer.- Zeer voorzichtig omgaan met begrazing door grote herbivoren.- Onderzoek naar populatie-eigenschappen, kiemomstandigheden en andere groeiplaatscondities, in combinatie met herintroductie op voormalige groeiplaatsen, of in de omgeving daarvan, zowel in de duinen als in Zuid-Limburg.
Belang Waterschapspopulaties	Ondergeschikt belang
Verspreiding binnen Nederland	Zeldzaam. Groeit in valleien en op noordhellingen in kalkrijke duinen. Komt voor in het Groningse Lauwersmeergebied en mogelijk nog op Schiermonnikoog. In de duinen bij Bergen mogelijk verdwenen. Vroeger op Voorne, in de duinen van IJmuiden, in Zeeuws-Vlaanderen en in Zuid-Limburg.
Status Rode lijst	Ernstig bedreigd
Beschermingsstatus	
Habitatrichtlijn	-
FF-wet	Tabel 2
Bronnen	Weeda <i>et al.</i> , 2003. Kreutz & Dekker, 2000 Websites: www.stowa.nl ; flora.instnat.be ; www.minlnv.nederlandsesoorten.nl ; www.soortenbank.nl