



## Houtsnip *Scolopax rusticola*



Forse, plompe steltloper met dikke buik en lange, rechte snavel. Roodbruine bovenzijde, lichtbruine onderzijde. Lichaam geheel voorzien van bruine vlekken en strepen en daardoor goed gecamoufleerd.

Foto: Rein Hofman

Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Groen: Werkzaamheden mogelijk. Oranje: Werkzaamheden mogelijk: ja, mits na overleg met ecooloog en eventuele mitigerende maatregelen. Rood: Werkzaamheden mogelijk: nee, tenzij toestemming van de ecooloog en mitigerende maatregelen worden genomen.

### Bestendig beheer en onderhoud (vrijstelling, mits gebruik gedragscode)

Maaien	-
Schonen	-
Baggeren	-
Snoeien/dunnen	Zie gedragscode, aanvullend: Als de soort (mogelijk) voorkomt alleen van oktober t/m maart. De houtsnip broedt in vochtige bossen en langs bosranden op de grond, aan de voet van een boom of in de dekking van braam, varens en andere overhangende vegetatie.
Onderhoud waterkeringen	-
Onderhoud verhardingen	-

### Ruimtelijke ontwikkeling en inrichting (vrijstelling, mits gebruik gedragscode)

Vorbereiding van nieuwe werken	Zie gedragscode
Verwijderen bovengrond/ graafwerkzaamheden	-
Sloop kunstwerken en gebouwen	-
Bouwactiviteiten	Zie gedragscode, aanvullend: Waar de soort (mogelijk) broedt: van oktober t/m maart.
Afdammen/dempen/vergraven	-
Leefgebied	Broedt in uitgestrekte vochtige bossen met veel open plekken en een rijke ondergroei van onder meer hazelaar en adelaarsvaren. De aanwezigheid van een mineralenrijke bodem is een voorwaarde. Broedt niet in kleine en geïsoleerd gelegen bossen. In de winter minder kritisch ten aanzien van type bos en ondergroei.
Gebruik van het leefgebied	Sterk bodemgebonden, maar voert in de schemering baltsvluchten uit vlak boven de boomtoppen over grote oppervlakten van het leefgebied. Polygaam. Foerageert door te prikken in de vochtige bosgrond en/of door te scharrelen door humuslaag. Kan tijdens de trek op onverwachte plaatsen opduiken zoals op havenhoofden en in kleine stadsparken.
Voornaamste voedselbronnen	Regenwormen, keverlarven en af en toe plantaardig materiaal.
Leefwijze door het jaar heen	De broedperiode loopt van begin maart tot eind september. Baltsvluchten van begin maart tot eind juni. Eieren en nesten met jongen van begin maart tot eind augustus. Vliegvlugge jongen rond de nestlocatie tot eind september. Vanaf oktober vindt aanvulling plaats van trekvogels uit Noord-Europa. Bij strenge vorst verlaten vrijwel alle houtsnippen Nederland.



- soort niet broedend
- mogelijk broedgeval
- broedgeval waarschijnlijk/zeker





## Vervolg

## Houtsnip *Scolopax rusticola*

Locatie nest	Op de grond, aan de voet van een boom of in de dekking van braam, varens en andere overhangende vegetatie.
Aanbevelingen	<ul style="list-style-type: none"><li>- Beheer richten op ontwikkeling en behoud van rijke ondergroei van bijvoorbeeld varens langs vochtige bosranden.</li><li>- Vermijd betreding van de directe omgeving van de grondnesten.</li></ul>
Belang Waterschapspopulaties	Ondergeschikt belang.
Verspreiding binnen Nederland	Vrij schaarse broedvogel in een aantal bosrijke regio's, met name de duinstreek incl. de Wadden eilanden, de grensstreek van Friesland en Drenthe, Overijssel, Flevoland, Gelderland en de Noord-Brabantse Meierij. Buiten de broedperiode in het gehele land aan te treffen (doortrekker in vrij groot aantal, wintervogel in klein aantal).
Rode lijst 2004	-
Beschermingsstatus Vogelrichtlijn	Voor deze soort zijn Natura 2000-gebieden aangewezen.
FF-wet	Strengbeschermd, gelijkgesteld aan tabel 3
Bronnen	Literatuur: Bijlsma <i>et al.</i> 2001; LNV, 2009; Snow & Perrins 1998; SOVON 2002. Websites: <a href="http://www.minlnv.nl">www.minlnv.nl</a> , <a href="http://www.nederlandsesoorten.nl">www.nederlandsesoorten.nl</a> .

