



Tabel 3

Iepenpage *Satyrium w-album*



Een vrij kleine bruine vlinder (vleugellengte 15 mm). Op de onderzijde van de achtervleugel zit een dunne witte lijn in de vorm van een W en is een oranje baan met een zwarte rand aanwezig. Aan de achtervleugel zit een staartje.

Foto: Liesbeth Leusink/
Bureau Waardenburg



- soort niet waargenomen
- soort (recent) waargenomen

3

Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Groen: Werkzaamheden mogelijk. Oranje: Werkzaamheden mogelijk: ja, mits na overleg met ecooloog en eventuele mitigerende maatregelen. Rood: Werkzaamheden mogelijk: nee, tenzij toestemming van de ecooloog en mitigerende maatregelen worden genomen.

Bestendig beheer en onderhoud (vrijstelling, mits gebruik gedragscode)

Maaien	-
Schonen	-
Baggeren	-
Begrazen	-
Snoeien/dunnen	Zie gedragscode, aanvullend:
Iepen met iepenpage ontzien.	
Onderhoud waterkeringen	-
Onderhoud verhardingen	-

Ruimtelijke ontwikkelingen & inrichting (ontheftingsplicht)

Vorbereiding van nieuwe werken **Zie gedragscode, aanvullend:** Iepen met iepenpage ontzien of desnoods boom verplaatsen in de winterperiode.

Verwijderen bovengrond/graafwerkzaamheden	-
Sloop kunstwerken en gebouwen	-
Bouwactiviteiten	-
Afdammen/dempen/vergraven	-

Leefgebied In iepen op zonnige, beschutte plaatsen. In gladde iep, ruwe iep en cultivars. De iepen staan in bosranden, parken, grote tuinen en in open (vochtige) bossen.

Gebruik van het leefgebied De iepenpage zit het grootste deel van zijn leven in boomkruinen van forse iepen. Soms komt hij naar beneden om te foerageren. Eitjes worden op knoppen van de iep afgezet (meestal bij de eindknop). Rupsen rusten en verpoppen zich aan de onderzijde van bladeren. Soms verpoppen de rupsen ook aan een bladstengel of een takje. De iepenpage is honkvast. Wel verlaten sommige exemplaren de oude boom om een nieuwe iep in de omgeving te koloniseren.

Voornaamste voedselbronnen Rupsen: bloemen en knoppen, later ook zaden en bladeren van verschillende soorten iep. Vlinders: honingdauw en boomsappen. Soms met nectar van braam en diverse kruiden.

Leefwijze door het jaar heen Vliegperiode: van half juni tot begin augustus. Eitjes worden tussen half juli en half augustus afgezet. De eitjes overwinteren. Rupsen zijn vanaf half maart tot begin juli aanwezig.

Vervolg: zie pagina 2



Vervolg

Iepenpage *Satyrium w-album*

Aanbevelingen	<ul style="list-style-type: none">- Bij rooien van iepen dient altijd eerst nagegaan te worden of de iepenpage voorkomt op de boom.- Iepenziekte bestrijden.- Geschikte standplaatsfactoren (zon en beschutting) rondom de iepen behouden. Wanneer een boom verplaatst wordt dient hij op zijn nieuwe plaats op een zonnige en beschutte plaats te staan.- Voldoende grote en vruchtdragende iepen behouden.- Nieuwe iepen aanplanten.
Belang waterschapspopulaties	Ondergeschikt belang
Verspreiding binnen Nederland	Op enkele plaatsen in Zuid-Limburg (Heerlen, Kerkrade). Waarschijnlijk ook in de buurt van Nijmegen en recent in Noord-Brabant.
Rode lijst	Ernstig bedreigd
Beschermingsstatus	
Habitatrichtlijn	-
FF-wet	Tabel 3
Bronnen	Wyhoff & Van Swaay, 1995. Maes & Van Dyck, 1999 Websites: www.vlindernet.nl ; www.minlnv.nederlandsesoorten.nl