



Kemphaan *Philomachus pugnax*



Variabele grote. Een kleine kop met langerekt lichaam, een lange hals en lichtgebogen middellange snavel. De bovenstaart heeft in vlucht twee ovale witte vlekken.

Foto: Ruben Fijn/Bureau Waardenburg

Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Groen: Werkzaamheden mogelijk. Oranje: Werkzaamheden mogelijk: ja, mits na overleg met ecooloog en eventuele mitigerende maatregelen. Rood: Werkzaamheden mogelijk: nee, tenzij toestemming van de ecooloog en mitigerende maatregelen worden genomen.

Bestendig beheer en onderhoud (vrijstelling, mits gebruik gedragscode)

Maaien	Zie gedragscode, aanvullend: Waar de soort (mogelijk) broedt alleen in de periode van half augustus t/m maart. De kemphaan broedt op de grond, in korte, dichte vegetatie in moeras of weide.
Schonen	Zie gedragscode, aanvullend: Als onder maaien.
Baggeren	Zie gedragscode, aanvullend: Als onder maaien.
Snoeien/dunnen	-
Onderhoud waterkeringen	-
Onderhoud verhardingen	-

Ruimtelijke ontwikkelingen & inrichting (vrijstelling, mits gebruik gedragscode)

Vorbereiding van nieuwe werken	Zie gedragscode
Verwijderen bovengrond/ graafwerkzaamheden	Zie gedragscode, aanvullend: Waar de soort (mogelijk) broedt alleen in de periode van half augustus t/m maart. De kemphaan broedt op de grond, in korte, dichte vegetatie in moeras of weide.
Slopen kunstwerken/gebouwen	Zie gedragscode, aanvullend: Als onder verwijderen bovengrond.
Bouwactiviteiten	Zie gedragscode, aanvullend: Als onder verwijderen bovengrond.
Afdammen/dempen/vergraven	Zie gedragscode, aanvullend: Als onder verwijderen bovengrond.

Leefgebied	Broedt in natte, schrale graslanden met een rijke vegetatiestructuur. In de winter hoofdzakelijk verblijvend in Afrika.
Gebruik van het leefgebied	In het broedseizoen in afwisselende veenweidegebieden (voedsel, rust en balts locaties). Buiten broedseizoen voornamelijk in gebieden met slik.

Voornaamste voedselbronnen	Ongewervelden en zaden.
Leefwijze door het jaar heen	De broedperiode loopt van begin april tot midden augustus. Vanaf begin april balts en van midden april-midden augustus nesten en paren met jongen. Buiten het broedseizoen migrerend tussen Afrika en Europa in onbegroeide, natte gebieden met zand en/of slik.
Locatie nest	Nest op de grond, in korte, dichte vegetatie in moeras of weide. Vervolg: zie pagina 2



- soort niet broedend
- mogelijk broedgeval
- broedgeval waarschijnlijk/zeker





Vervolg

Kemphaan *Philomachus pugnax*

Aanbevelingen	<ul style="list-style-type: none">- Vermijd wijzigingen van het waterpeil binnen de voortplantingsperiode.- Beheer van veenweide gebieden extensiveren (minder en later maaien, beweiden, bemesten).- Vermijd betreding en het uitvoeren van werkzaamheden in potentiële broedbiotopen gedurende het broedseizoen (inclusief baltsplekken).
Belang waterschapspopulaties	Groot nationaal belang
Verspreiding binnen Nederland	In Nederland algemeen. Tijdens het broedseizoen voornamelijk in lage dichtheden in Friesland, Noord-Holland en Zuid-Holland.
Rode lijst	Ernstig bedreigd
Beschermingsstatus Vogelrichtlijn	Voor deze soort zijn Natura 2000-gebieden aangewezen.
FF-wet	Strengbeschermd, gelijkgesteld met tabel 3
Bronnen	Literatuur: van de Kam <i>et al.</i> 1999; Snow & Perrins, 1998; SOVON, 2002. Websites: www.minlnv.nl ; www.nederlandsesoorten.nl ; www.bto.org

