



Kerkuil *Tyto alba*



Middelgrote slanke uil met lange vleugels en een hartvormig gezicht met zwarte ogen. Oranjegrijze bovendelen, maar grotendeels witte buik en ondervleugels. Oogt daarom vooral in de vlucht zeer licht ('spook van de nacht'). Langzame, schommelende vlucht. Bidt regelmatig.

Foto: Rein Hofman



- soort niet broedend
- mogelijk broedgeval
- broedgeval waarschijnlijk/zeker

Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Groen: Werkzaamheden mogelijk. Oranje: Werkzaamheden mogelijk: ja, mits na overleg met ecooloog en eventuele mitigerende maatregelen. Rood: Werkzaamheden mogelijk: nee, tenzij toestemming van de ecooloog en mitigerende maatregelen worden genomen.

Bestendig beheer en onderhoud (vrijstelling, mits gebruik gedragscode)

Maaien	-
Schonen	-
Baggeren	-
Snoeien/dunnen	-
Onderhoud waterkeringen	-
Onderhoud verhardingen	-

Ruimtelijke ontwikkeling en inrichting (vrijstelling, mits gebruik gedragscode)

Vorbereiding van nieuwe werken	Zie gedragscode
Verwijderen bovengrond/ graafwerkzaamheden	-
Sloop kunstwerken en gebouwen	Zie gedragscode, aanvullend: Nesten zijn jaarrond beschermd. Kerkuilen zijn in Nederland jaarrond afhankelijk van gebouwen (rust- en broedplaats): aan- of afwezigheid van kerkuilen dient voorafgaand aan sloop op elk moment van het jaar te worden vastgesteld.
Bouwactiviteiten	Zie gedragscode, aanvullend: Waar de soort (mogelijk) broedt: bij voorkeur van januari t/m maart.
Afdammen/dempen/vergraven	-

Leefgebied Broedt in open, maar niet boomloze, agrarische gebieden. In lintdorpen en boerendorpen, liefst in kleinschalig landschap met veel 'faunaranden' voor een hoog prooiaanbod, onder meer in de vorm van rijk begroeide bermen, akkerranden, dijken, heggen, houtwallen en ruige overhoekjes.

Gebruik van het leefgebied Verblijft overdag in gebouwen op de rust- en/of nestplaats. Jaagt 's nachts langs lijnvormige elementen zoals bermen. Loopt hierbij groot risico om aangereden te worden (>50% komt om in het verkeer).

Voornaamste voedselbronnen Muizen en spitsmuizen.

Leefwijze door het jaar heen Kan in principe het gehele jaar broeden. Doorgaans zijn eieren en jongen echter aanwezig van begin april tot eind september. Vliegvlugge jongen kunnen aanwezig zijn tot in december. Kerkuilen verblijven het gehele jaar in hetzelfde gebied.

Locatie nest In nissen van kerktorens, op balken in stallen, schuren en andere toegankelijke gebouwen in agrarisch gebied. Maakt gretig gebruik van nestkasten in dergelijke gebouwen.

Vervolg: zie pagina 2



Vervolg

Kerkuil *Tyto alba*

Aanbevelingen

- Let op: nesten zijn jaarrond beschermd.
- Schuren, stallen e.d. waarin gebroed wordt behouden.
- Beheer van dijklichamen, wegbermen en dergelijke richten op hoog muizenaanbod, hooguit eenmaal per jaar maaien.
- Nestkasten aanbrengen in gebouwen binnen potentieel leefgebied.

Belang Waterschapspopulaties

Ondergeschikt belang.

Verspreiding binnen Nederland

Schaarse broedvogel in het grootste deel van het land. Ontbreekt vrijwel in Zuid-Holland en op de Waddeneilanden en is zeldzaam in Utrecht, Groningen en op de Veluwe.

Rode lijst 2004

Kwetsbaar

Beschermingsstatus Vogelrichtlijn

Voor deze soort zijn geen Natura 2000-gebieden aangewezen.

FF-wet

Strengbeschermd, gelijkgesteld aan tabel 3. Jaarrond beschermd nest.

Bronnen

Literatuur: Bijlsma *et al.*, 2001; LNV, 2009; Snow & Perrins 1998; SOVON 2002.
Websites: www.minlnv.nl;
www.nederlandsesoorten.nl.

