



Kievit *Vanellus vanellus*



Een vrij grote steltloper, bovenzijde is egaal donker, koptekening met opvallende kuif en donker voorhoofd en gezicht. Onderzijde helder wit met donkere borstband.

Foto: Rein Hofman



- soort niet broedend
- mogelijk broedgeval
- broedgeval waarschijnlijk/zeker

Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec

Groen: Werkzaamheden mogelijk. Oranje: Werkzaamheden mogelijk: ja, mits na overleg met ecooloog en eventuele mitigerende maatregelen. Rood: Werkzaamheden mogelijk: nee, tenzij toestemming van de ecooloog en mitigerende maatregelen worden genomen.

Bestendig beheer en onderhoud (vrijstelling, mits gebruik gedragscode)

Maaien	Zie gedragscode, aanvullend: Waar de soort (mogelijk) broedt alleen in de periode van half augustus t/m februari. De kievit broedt op de grond, op onbegroeide of schaars begroeide bodem.
Schonen	Zie gedragscode, aanvullend: Als onder maaien.
Baggeren	Zie gedragscode, aanvullend: Als onder maaien.
Snoeien/dunnen	-
Onderhoud waterkeringen	-
Onderhoud verhardingen	-

Ruimtelijke ontwikkelingen & inrichting (vrijstelling, mits gebruik gedragscode)

Vorbereiding van nieuwe werken	Zie gedragscode
Verwijderen bovengrond/graafwerkzaamheden	Zie gedragscode, aanvullend: Waar de soort (mogelijk) broedt alleen in de periode van half augustus t/m februari. De kievit broedt op de grond, op onbegroeide of schaars begroeide bodem.
Slopen kunstwerken/gebouwen	Zie gedragscode, aanvullend: Als onder verwijderen bovengrond.
Bouwactiviteiten	Zie gedragscode, aanvullend: Als onder verwijderen bovengrond.
Afdammen/dempen/vergraven	Zie gedragscode, aanvullend: Als onder verwijderen bovengrond.

Leefgebied	Broedt in lage, open grasland en akkergebieden. In de winter verblijvend in agrarische- en moerasgebieden binnen Nederland en Zuidwest-Europa.
Gebruik van het leefgebied	In het broedseizoen in lage, open grasland- en akkergebieden. Buiten het broedseizoen voornamelijk in agrarisch gebied en moerassen.

Voornaamste voedselbronnen	Ongewervelden.
Leefwijze door het jaar heen	De broedperiode loopt van begin maart tot half augustus. In begin maart de balts en nestbouw, vanaf half maart tot half augustus nesten en paren met jongen. Buiten het broedseizoen verblijven de vogels in Nederland of in Zuidwest-Europa in agrarisch gebied en moerassen.

Locatie nest	Nest op de grond, op onbegroeide of schaars begroeide bodem.
--------------	--

Vervolg: zie pagina 2



Vervolg

Kievit *Vanellus vanellus*

Aanbevelingen	<ul style="list-style-type: none">- Vermijd wijzigingen van het waterpeil binnen de voortplantingsperiode.- Beheer van veenweidegebieden extensiveren (minder en later maaien, beweiden en bemesten).- Vermijd betreding en het uitvoeren van werkzaamheden in potentiële broedbiotopen gedurende het broedseizoen.
Belang waterschapspopulaties	Groot nationaal belang
Verspreiding binnen Nederland	In Nederland algemeen. Tijdens het broedseizoen vrijwel in geheel Nederland met uitzondering van de Veluwe, Zuid-Limburg en stedelijke gebieden.
Rode lijst	-
Beschermingsstatus Vogelrichtlijn	Voor deze soort zijn Natura 2000-gebieden aangewezen.
FF-wet	Strengbeschermd, gelijkgesteld aan tabel 3
Bronnen	Literatuur: van de Kam <i>et al.</i> 1999; LNV, 2009; Snow & Perrins, 1998; SOVON, 2002. Websites: www.minlnv.nl ; www.nederlandsesoorten.nl ; www.bto.org

