




## Tabel 2

## Kleine modderkruiper *Cobitis taenia*



Lengte ca. 10 cm. Slank lichaam, zijdelings afgeplat, 6 bekdraden. Lichaam lichtgeel en grijs. Op de zijkant 1 of 2 rijen met 10 tot 20 rechthoekige vlekken.  
Foto: Ewoud van der Ploeg



- soort niet waargenomen
- soort (recent) waargenomen

2

Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Groen: Werkzaamheden mogelijk. Oranje: Werkzaamheden mogelijk: ja, mits na overleg met ecooloog en eventuele mitigerende maatregelen. Rood: Werkzaamheden mogelijk: nee, tenzij toestemming van de ecooloog en mitigerende maatregelen worden genomen.

### Bestendig beheer en onderhoud (vrijstelling, mits gebruik gedragscode)

Maaien	-
Schonen	Zie gedragscode, aanvullend: In februari-maart of september-oktober. Boven de bodem schonen, zodat knipmessen geen schade aan de vis toebrengen. Bak bij het schonen niet te vol laten lopen zodat vissen tussen de spijlen kunnen ontsnappen.
Baggeren	Zie gedragscode, aanvullend: In februari-maart of september-oktober.
Begrazen	-
Snoeien/dunnen	-
Onderhoud waterkeringen	Zie gedragscode, aanvullend: In februari-maart of september-oktober.
Onderhoud verhardingen	-

### Ruimtelijke ontwikkeling en inrichting (vrijstelling, mits gebruik gedragscode)

Vorbereiding van nieuwe werken	Zie gedragscode
Verwijderen bovengrond/graafwerkzaamheden	Zie gedragscode, aanvullend: In februari-maart of september-oktober.
Sloop kunstwerken en gebouwen	-
Bouwactiviteiten	-
Afdammen/dempen/vergraven wateren	Zie gedragscode, aanvullend: In februari-maart of september-oktober.
Leefgebied	Stilstaande tot langzaam stromende wateren. Bij voorkeur sloten en kleine traag stromende beken met een zandige tot modderige bodem.
Gebruik van het leefgebied	Paai vindt op de bodem plaats. Eieren worden afgezet op zand of planten. Schuilgelegenheid wordt gezocht in de bodem, onder stenen of waterplanten. Ook voedsel wordt op de bodem gezocht.
Voornaamste voedselbronnen	Insectenlarven, kleine kreeftachtigen, organische resten.
Leefwijze door het jaar heen	Niet territoriaal. In de winter leven de dieren doorgaans in groepen. Migratie over korte afstanden: stroomafwaarts voor de voortplanting, daarna weer stroomopwaarts. Overwegend nachtactief; overdag houden ze zich schuil. Paaitijd: april-juli. Er wordt enkele keren gepaaid. Van november-februari is de activiteit beperkt (winterrust).

Vervolg: zie pagina 2



## Vervolg

## Kleine modderkruiper *Cobitis taenia*

Aanbevelingen	- Aanbrengen vispassages. - Waterzuivering.
Belang waterschapspopulaties	Groot internationaal belang
Verspreiding binnen Nederland	Frequent, maar diffuus. In heel Nederland m.u.v. de Zeeuwsche eilanden.
Rode lijst	-
Beschermingsstatus	Habitatrichtlijn
Bijlage II	
FF-wet	Tabel 2
Bronnen	Van Emmerik & de Nie, 2006; Crombaghs <i>et al.</i> , 2000; Websites: <a href="http://www.minlnv.nederlandsesoorten.nl">www.minlnv.nederlandsesoorten.nl</a>