




## Tabel 2

## Kleine zonnedauw *Drosera intermedia*



Een insectenetende plant van 0,5 tot 10 cm hoog. De bladeren hebben rode tentakels met kleverige vochtdruppeltjes. De bloemen zijn klein en wit. Onderscheid met de andere zonnedauwsoorten: gebogen bloeistengel en opstaande, eironde bladeren. Ook is de kleur meer bruinrood.

Foto: Saskia Vleeming



- soort niet aanwezig
- soort (recent) aanwezig

2

Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec

Groen: Werkzaamheden mogelijk. Oranje: Werkzaamheden mogelijk: ja, mits na overleg met ecooloog en eventuele mitigerende maatregelen. Rood: Werkzaamheden mogelijk: nee, tenzij toestemming van de ecooloog en mitigerende maatregelen worden genomen.

### Bestendig beheer en onderhoud (vrijstelling, mits gebruik gedragscode)

Maaien	Zie gedragscode, aanvullend: Vanaf september-oktober
Schonen	Zie gedragscode
Baggeren	Zie gedragscode
Begrazen	Zie gedragscode, aanvullend: Zeer extensief.
Snoeien/dunnen	-
Onderhoud waterkeringen	Zie gedragscode, aanvullend: Groeiplaatsen ontzien of desnoods de plant uitgraven en zo snel mogelijk opnieuw uitplanten, onder begeleiding van een deskundige.
Onderhoud verhardingen	-

### Ruimtelijke ontwikkelingen & inrichting (vrijstelling, mits gebruik gedragscode)

Vorbereiding van nieuwe werken	Zie gedragscode, aanvullend: Groeiplaatsen ontzien of desnoods de plant uitgraven en zo snel mogelijk opnieuw uitplanten, onder begeleiding van een deskundige.
Verwijderen bovengrond/ graafwerkzaamheden	Zie gedragscode, aanvullend: Groeiplaatsen ontzien of desnoods de plant uitgraven en zo snel mogelijk opnieuw uitplanten, onder begeleiding van een deskundige.
Sloop kunstwerken en gebouwen	-
Bouwactiviteiten	-
Afdammen/dempen/vergraven	Zie gedragscode, aanvullend: Geen grootschalige ingrepen in de waterhuishouding mogelijk.

Groeiplaats	Een vochtminnende plant die soms tot in het water kan staan. De plant komt voor op zonnige, natte, voedselarme, zure grond. Op zandgrond, zelden op veengrond. De soort is karakteristiek voor natte heiden op minerale bodems maar kan ook in lagere dichtheden in onbemeste graslanden voorkomen.
Leefwijze door het jaar heen	Bloeiperiode: juli-augustus. Zaadverspreiding van september tot december via wind en water. Het zaad blijft tot 5 jaar kiemkrachtig. Het kan alleen kiemen na een vorstperiode. De plant vermeerdt zich ook vegetatief via broedknoppen. De plant is meerjarig en overwintert met zijn knoppen op of onder de grond of onder water. De plant groeit meestal in dichte groepen.

Vervolg: zie pagina 2



## Vervolg

### Kleine zonnedaauw *Drosera intermedia*

Aanbevelingen	<ul style="list-style-type: none"><li>- Niet bemesten.</li><li>- Vernatten. Kleine zonnedaauw kan enkele jaren natte zomers overleven, maar moet voor bloei en vruchtzetting droogstaan.</li><li>- Plaggen of extensieve begrazing van venoevers, eventueel aangevuld met maaien. Door te plaggen of door begrazing ontstaat een geschikt kiemingsmilieu voor kleine zonnedaauw.</li></ul>
Verspreiding binnen Nederland	Vooral in de zandgebieden het oosten en in het zuiden van Nederland, zeer weinig in de duinen en in het laagveengebied.
Belang waterschapspopulaties	Ondergeschikt belang
Status Rode lijst	Gevoelig
Beschermingsstatus	
Habitatrichtlijn	-
FF-wet	Tabel 2
Bronnen	Weeda <i>et al.</i> , 2003. Van der Meijden, 2005. Schaminée <i>et al.</i> , 1995. Websites: <a href="http://flora.instnat.be">flora.instnat.be</a> ; <a href="http://www.soortenbank.nl">www.soortenbank.nl</a>