




Tabel 2

Klokjesgentiaan *Gentiana pneumonanthe*



Klokjesgentiaan is 15 tot 60 cm hoog. De bloem is trechtervormig en blauw tot paars van kleur. De bloem heeft groene stippen aan de binnenkant en groene strepen aan de buitenkant. De bladeren zijn langwerpige.

Foto: Christophe Brochard



- soort niet aanwezig
- soort (recent) aanwezig

2

Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Groen: Werkzaamheden mogelijk. Oranje: Werkzaamheden mogelijk: ja, mits na overleg met ecooloog en eventuele mitigerende maatregelen. Rood: Werkzaamheden mogelijk: nee, tenzij toestemming van de ecooloog en mitigerende maatregelen worden genomen.

Bestendig beheer en onderhoud (vrijstelling, mits gebruik gedragscode)

Maaien	Zie gedragscode, aanvullend: In september-oktober.
Schonen	Zie gedragscode
Baggeren	Zie gedragscode
Begrazen	Zie gedragscode, aanvullend: Extensief of periodiek.
Snoeien/dunnen	-
Onderhoud waterkeringen	Zie gedragscode
Onderhoud verhardingen	Zie gedragscode

Ruimtelijke ontwikkelingen & inrichting (vrijstelling, mits gebruik gedragscode)

Vorbereiding van nieuwe werken	Zie gedragscode, aanvullend: Groeiplaatsen ontzien of desnoods de plant uitgraven en zo snel mogelijk opnieuw uitplanten, onder begeleiding van een deskundige.
Verwijderen bovengrond/ graafwerkzaamheden	Zie gedragscode, aanvullend: Groeiplaatsen ontzien of desnoods de plant uitgraven en zo snel mogelijk opnieuw uitplanten, onder begeleiding van een deskundige.
Sloop kunstwerken en gebouwen	-
Bouwactiviteiten	-
Afdammen/dempen/vergraven	Zie gedragscode, aanvullend: Geen grootschalige ingrepen in de waterhuishouding mogelijk.
Groeiplaats	Een plant van zonnige plaatsen op natte, zure, matig voedselarme grond. Op zand, leem en veengrond. De bodem is in de winter drassig en droogt in de zomer slechts oppervlakkig uit. De soort groeit in vochtige tot natte heiden, in korte graslanden, in blauwgraslanden, op afgeplagde terreinen en langs venoevers.
Leefwijze door het jaar heen	Bloeiperiode: juli-september. De zaden worden via de wind verspreid vanaf augustus tot in de herfst. Het zaad blijft zelden langer dan één jaar kiemkrachtig. Onder droge omstandigheden kunnen de zaden niet kiemen. Op kale grond kiemen de zaden goed. De plant is meerjarig en overwintert met zijn knoppen op of onder de grond. Nieuwe scheuten zijn al vanaf de nazomer aanwezig.

Vervolg: zie pagina 2



Vervolg

Klokjesgentiaan *Gentiana pneumonanthe*

Aanbevelingen	<ul style="list-style-type: none">- Er mag pas laat in het seizoen gemaaid worden, omdat eind juli tot half augustus de dagvlinder gentiaanblauwtje eitjes afzet op de klokjesgentiaan. Eveneens dienen nesten van de steekmier (de waardmier van het gentiaanblauwtje) te worden ontzien bij het uitvoeren van beheerwerkzaamheden.- Instandhouden specifieke waterhuishouding en lage waterstanden vermijden. Bij herstel grondwaterinvloed: geleidelijk vernatten verspreid over meerdere jaren. Niet teveel vernatting vanwege nesten van de steekmier, die minder goed tegen inundatie kunnen dan de klokjesgentiaan zelf.- Kleinschalig plaggen en opslag verwijderen bij vergrassing of bosopslag.
Verspreiding binnen Nederland	Op de pleistocene zandgronden, in sommige laagveengebieden en in de duinen van Texel, Terschelling en Ameland.
Belang waterschapspopulaties	Ondergeschikt belang
Status Rode lijst	Gevoelig
Beschermingsstatus	
Habitatrichtlijn	-
FF-wet	Tabel 2
Bronnen	Weeda <i>et al.</i> , 2003. Van der Meijden, 2005. Schaminée, 1996. Websites: flora.instnat.be ; www.gentiaanblautwje.nl