



Tabel 1

## Knikkende vogelmelk *Ornithogalum nutans*



Een middelhoge plant met breed lijnvormige bladeren. De bloemen zijn van binnen wit en van buiten groen en zitten in een naar één kant gekeerde tros. Vergeleken met gewone vogelmelk zijn de bloemstelen korter en knikken de bloemen tijdens de bloei.

Foto: Natalia Paklina/  
Buiten-Beeld



○ soort niet aanwezig  
● soort (recent) aanwezig

1

Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Groen: Werkzaamheden mogelijk. Oranje: Werkzaamheden mogelijk: ja, mits na overleg met ecooloog en eventuele mitigerende maatregelen. Rood: Werkzaamheden mogelijk: nee, tenzij toestemming van de ecooloog en mitigerende maatregelen worden genomen.

### Bestendig beheer en onderhoud (vrijstelling)

Maaien	Twee keer per jaar maaien: vanaf half juni en vanaf half september. Maaisel afvoeren.
Schonen	-
Baggeren	-
Begrazen	Extensieve begrazing is mogelijk vanaf juni (niet in april en mei).
Snoeien/dunnen	Enkele schaduwgevende struiken/bomen laten staan.
Onderhoud waterkeringen	Groeiplaatsen ontzien of desnoods plant uitgraven en zo snel mogelijk opnieuw uitplanten, onder begeleiding van een ecooloog.
Onderhoud verhardingen	Gladheidbestrijding met niet schadelijke middelen (de plant is zoutgevoelig).

### Ruimtelijke ontwikkelingen & inrichting (vrijstelling)

Vorbereiding van nieuwe werken	Groeiplaatsen ontzien of desnoods plant uitgraven en zo snel mogelijk opnieuw uitplanten, onder begeleiding van een ecooloog.
Verwijderen bovengrond/graafwerkzaamheden	Groeiplaatsen ontzien of desnoods plant uitgraven en zo snel mogelijk opnieuw uitplanten, onder begeleiding van een ecooloog.
Sloop kunstwerken en gebouwen	-
Bouwactiviteiten	-
Afdammen/dempen/vergraven	-

**Groeiplaats** Landplant. De plant groeit op vochtige, humushoudende, voedselrijke zand- en kleigrond. Voorkeur voor licht beschaduwde plaatsen. Knikkende vogelmelk is geen inheemse soort en komt voornamelijk voor in tuinen, parken en landgoederen.

**Leefwijze door het jaar heen** Bloeiperiode: april-mei. Na de bloei sterven de bladeren af en in is de plant alleen nog als bol in de grond aanwezig. De plant bevat oliehoudende zaden die door mieren worden verslept. Ook vermeerdert de plant zich via nevenbollen. De plant overwintert als bolgewas in de grond.

**Aanbevelingen** Lichte bodembewerking  
**Verspreiding binnen Nederland** Noordwestelijke helft van Friesland, langs de Utrechtse Vecht, aan de binnenduinrand, op Texel, in de westelijke helft van Groningen, in het rivierengebied, in Zeeland. Elders sporadisch.

Vervolg: zie pagina 2



## Vervolg

## Knikkende vogelmelk *Ornithogalum nutans*

Belang waterschapspopulaties	Ondergeschikt belang
Status Rode lijst	-
Beschermingsstatus	
Habitatrichtlijn	-
FF-wet	Tabel 1
Bronnen	Weeda <i>et al.</i> , 2003. Van der Meijden, 2005.