



## Kolgans *Anser albifrons*



Middelgrote, compacte gans, bovenzijde donkergrijsbruin, kop met witte bles, onderzijde met brede zwarte banden op buik en orangerode poten.

Foto: Martin Bonte



- soort niet broedend
- mogelijk broedgeval
- broedgeval waarschijnlijk/zeker

Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec

Groen: Werkzaamheden mogelijk. Oranje: Werkzaamheden mogelijk: ja, mits na overleg met ecooloog en eventuele mitigerende maatregelen. Rood: Werkzaamheden mogelijk: nee, tenzij toestemming van de ecooloog en mitigerende maatregelen worden genomen.

### Bestendig beheer en onderhoud (vrijstelling, mits gebruik gedragscode)

Maaien	Zie gedragscode, aanvullend: Waar de soort (mogelijk) broedt alleen in de periode van augustus t/m maart. Kolganzen broeden op de grond, meestal in de buurt van water in rietkragen op oevers en in moerasbossen.
Schonen	Zie gedragscode, aanvullend: Als onder maaien.
Baggeren	Zie gedragscode, aanvullend: Als onder maaien.
Snoeien/dunnen	Zie gedragscode, aanvullend: Als onder maaien.
Onderhoud waterkeringen	-
Onderhoud verhardingen	-

### Ruimtelijke ontwikkelingen & inrichting (vrijstelling, mits gebruik gedragscode)

Vorbereiding van nieuwe werken	Zie gedragscode
Verwijderen bovengrond/graafwerkzaamheden	Zie gedragscode Waar de soort (mogelijk) broedt alleen in de periode van augustus t/m maart. Kolganzen broeden op de grond, meestal in de buurt van water in rietkragen op oevers en in moerasbossen.
Slopen kunstwerken/gebouwen	Zie gedragscode, aanvullend: Als onder verwijderen bovengrond.
Bouwactiviteiten	Zie gedragscode, aanvullend: Als onder verwijderen bovengrond.
Afdammen/dempen/vergraven	Zie gedragscode, aanvullend: Als onder verwijderen bovengrond.
Leefgebied	Broedt op beschutte locaties in de omgeving van open water in combinatie met grasland. In de winter in groepen in akker en weidegebieden (foerageergebied) en open water (rustgebied).
Gebruik van het leefgebied	Jaarrond te vinden in waterrijke gebieden in combinatie met graslanden. In de winter talrijker door aanvulling van overwinterende populaties uit het leefgebied rond de poolcirkel.
Voornaamste voedselbronnen	Grassen en zaden.
Leefwijze door het jaar heen	De broedperiode loopt van begin april tot eind juli. In april balts en van april-augustus nesten en paren met jongen. In de winterperiode zijn de vogels met name in akker en weidegebieden (foerageergebied) en open water (rustgebied) in grote aantallen te vinden.

Vervolg: zie pagina 2



## Vervolg

## Kolgans *Anser albifrons*

Locatie nest	Op de grond, meestal in de buurt van water in rietkragen en moerasbossen, maar ook op schaars begroeide eilanden.
Aanbevelingen	- Vermijd betreding en het uitvoeren van werkzaamheden in gebieden met concentraties ganzen in foerageergebieden en met name slaappleatsen in het winterseizoen (oktober-maart).
Belang waterschapspopulaties	Groot nationaal belang.
Verspreiding binnen Nederland	In Nederland algemeen. Tijdens het broedseizoen voornamelijk in kleine aantallen in Friesland, de Zeeuwse delta en het rivierengebied
Rode lijst	-
Beschermingsstatus Vogelrichtlijn	Voor deze soort zijn Natura 2000-gebieden aangewezen.
FF-wet	Strengbeschermd, gelijkgesteld aan tabel 3
Bronnen	Literatuur: van de Kam <i>et al.</i> , 1999; LNV, 2009; Snow & Perrins, 1998; SOVON, 2002. Websites: <a href="http://www.minlnv.nl">www.minlnv.nl</a> ; <a href="http://www.nederlandsesoorten.nl">www.nederlandsesoorten.nl</a> ; <a href="http://www.bto.org">www.bto.org</a>

