



Tabel 1

Konijn *Oryctolagus cuniculus*



Vacht zandkleurig tot grijsbruin, nek roodbruin. Oren korter dan bij haas. Achterpoten minder sterk ontwikkeld dan bij haas. Korte witte staart met deels zwarte bovenzijde.

Foto: Saskia Vleeming/Bureau Waardenburg



- soort niet waargenomen
- soort (recent) waargenomen

1

Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Groen: Werkzaamheden mogelijk. Oranje: Werkzaamheden mogelijk: ja, mits na overleg met ecooloog en eventuele mitigerende maatregelen. Rood: Werkzaamheden mogelijk: nee, tenzij toestemming van de ecooloog en mitigerende maatregelen worden genomen.

Bestendig beheer en onderhoud (vrijstelling)

Maaien	Gefaseerd maaien in ruimte en tijd rondom burchtlocaties.
Schonen	-
Baggeren	-
Begrazen	-
Snoeien/dunnen	Werkzaamheden rondom burchtlocaties bij voorkeur uitvoeren in de periode augustus t/m november.
Onderhoud waterkeringen	-
Onderhoud verhardingen	-

Ruimtelijke ontwikkeling en inrichting (vrijstelling)

Vorbereiding van nieuwe werken	-
Verwijderen bovengrond/ graafwerkzaamheden	Werkzaamheden rondom burchtlocaties bij voorkeur uitvoeren in de periode augustus t/m november. Gefaseerde uitvoering van de werkzaamheden in ruimte en tijd. Zorgvuldig te werk gaan, dieren mogelijkheid geven om te vluchten.
Sloop kunstwerken en gebouwen	-
Bouwactiviteiten	Werkzaamheden rondom burchtlocaties bij voorkeur uitvoeren in de periode augustus t/m november. Gefaseerde uitvoering van de werkzaamheden in ruimte en tijd. Zorgvuldig te werk gaan, dieren mogelijkheid geven om te vluchten.
Afdammen/dempen/ vergraven wateren	-
Leefgebied	Droge, zandige gebieden en halfopen landschappen. Diverse landschapstypen, waaronder: houtwallen, bos(randen), duinen, industrieterreinen, bermen en dijken.
Gebruik van het leefgebied	Leven in holen en gangenstelsels (burchten). Daarnaast wordt ook bovengronds gebruik gemaakt van rustplaatsen (ondiepe uithollingen in vegetatie). Een burcht wordt door één familie van max. 10 leden bewoond.
Voornaamste voedselbronnen	Scheuten en wortels van grassen en kruiden en loten van jonge struiken en bomen.

Vervolg: zie pagina 2



Vervolg

Konijn *Oryctolagus cuniculus*

Leefwijze door het jaar heen	Leven in families met één dominant paar en enkele ondergeschikte mannetjes en vrouwtjes. Jaarrond actief, overwegend in de schemering en 's nachts. Grootte leefgebied: 50 m. rondom burcht. Voortplantingsseizoen: januari-augustus. Er zijn 2-3 worpen per jaar met 3-7 jongen per worp. Grote fluctuaties in populatieomvang tussen de jaren. Dichtheden door het jaar heen fluctueren fors van 1-15 dieren (winter) tot 1-40 dieren (zomer) per ha.
Aanbevelingen	-
Belang waterschapspopulaties	Ondergeschikt belang
Verspreiding binnen Nederland	Algemeen. Verspreid in heel Nederland, m.u.v. de meer open delen van Noord- en Zuid-Holland en Friesland.
Rode lijst	-
Beschermingsstatus	
Habitatrichtlijn	-
FF-wet	Tabel 1
Bronnen	Lange <i>et al.</i> 1994; Broekhuizen <i>et al.</i> 1992; Websites: www.minlnv.nederlandsesoorten.nl ; www.vzz.nl