



Kraaiachtigen

Groen: Werkzaamheden mogelijk. Oranje: Werkzaamheden mogelijk: ja, mits na overleg met ecooloog en eventuele mitigerende maatregelen. Rood: Werkzaamheden mogelijk: nee, tenzij toestemming van de ecooloog en mitigerende maatregelen worden genomen.

Bonte kraai *Corvus cornix*



Foto: Han Bouwmeester/Buiten-Beeld



Herkenning: middelgrote kraai. Bovenzijde grijs met zwarte kop, vleugels en staart.

Onderzijde grotendeels grijs met zwarte keel en borst.

Verspreiding: in Nederland schaars. In het broedseizoen incidenteel en onregelmatig in noord Nederland.



- soort niet broedend
- mogelijk broedgeval
- broedgeval waarschijnlijk/zeker

Ekster *Pica pica*

Nesten niet jaarrond beschermd, wel inventarisatie gewenst.



Foto: Ruben Fijn/Bureau Waardenburg



Herkenning: middelgrote zangvogel met lange staart. Bovenzijde donker met groene en blauwe glans en een witte schouderstreep, donkere borst en witte buik.

Verspreiding: komt in Nederland algemeen voor. De hoogste dichtheden komen voor in het zuiden en westen van Nederland.



- soort niet broedend
- mogelijk broedgeval
- broedgeval waarschijnlijk/zeker

Zie vervolg



Vervolg

Kraaiachtigen

Raaf *Corvus corax*

Nesten niet jaarrond beschermd, wel inventarisatie gewenst.




Foto: Han Bouwmeester/Buiten-Beeld



Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Herkenning: grote, zwaargebouwde kraai met wigvormige staart. Lichaam egaal zwart met lange, slanke vleugels. Vrij kleine kop met zeer zware snavel.

Verspreiding: in Nederland schaars tot vrij algemeen. In het broedseizoen voornamelijk op de Veluwe, Utrechtse Heuvelrug, Twente en de Achterhoek.



Zwarte kraai *Corvus corone*

Nesten niet jaarrond beschermd, wel inventarisatie gewenst.



Foto: Ran Schols/Buiten-Beeld



Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Herkenning: middelgrote kraai. Lichaam egaal zwart met brede vleugels en driehoekige snavel.

Verspreiding: in Nederland algemeen. In het broedseizoen komen de hoogste dichtheden voor in het oosten en zuiden van Nederland.



Bestendig beheer en onderhoud (vrijstelling, mits gebruik gedragscode)

Maaien	-
Schonen	-
Baggeren	-
Begrazen	-
Snoeien/dunnen	Zie gedragscode, aanvullend: Vooraf inventarisatie van kraaiennesten gewenst. (Oude) nesten van kraaiachtigen worden ook gebruikt door roofvogels en ransuilen. In dat geval zijn nesten wel jaarrond beschermd. Snoeien bij voorkeur van half juli tot half januari. Zie soortspecifieke informatie omtrent actuele verspreiding, habitatgeschiktheid en kwetsbare periode.
Onderhoud waterkeringen	-
Onderhoud verhardingen	-

Zie vervolg



Vervolg

Kraaiachtigen

Ruimtelijke ontwikkeling en inrichting

Vorbereiding van nieuwe werken **Zie gedragscode, aanvullend:**
Inventarisatie van kraaiennesten gewenst.

Verwijderen bovengrond/
graafwerkzaamheden **Zie gedragscode, aanvullend:**
Werkzaamheden bij voorkeur van half juli tot half januari.

Sloop kunstwerken en gebouwen -

Bouwactiviteiten **Zie gedragscode, aanvullend:**
Als verwijderen bovengrond

Afdammen/dempen/vergraven

	<i>Biotoop, habitatype</i>					<i>Voedsel</i>				<i>Rode Lijst, bescherming</i>				
	Diverse bostypen.	Bosranden, open bos en parklandschap	Akkers en weiden	Heide	Dorpen en steden	Ongewervelden	Zaden, fruit	Eieren en jonge vogels	Aas	Geen Rode Lijst status	Gevoelig / Kwetsbaar	Bedreigd / Ernstig bedreigd	Flora- en faunawet	Vogelinrichtinggebieden aangewezen
Bonte kraai	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	
Ekster			•		•	•	•	•	•	•			•	
Raaf	•	•	•	•		•	•	•	•		•		•	
Zwarte kraai	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	

Leefwijze door het jaar heen De broedperiode valt, afhankelijk van de soort, binnen de periode van midden januari tot midden juli. Van midden januari-eind maart balts, van begin februari-eind juni nesten en paren met jongen en van midden juni-midden juli verzorging van vliegvlugge jongen.

Locatie nest In Nederland hoofdzakelijk in bomen.

Aanbevelingen - Nesten van kraaiachtigen zijn niet jaarrond beschermd. Door LNV wordt echter wel inventarisatie van nesten van deze soorten gewenst. De nesten zijn wel jaarrond beschermd als zwaarwegende feiten of ecologische omstandigheden dat rechtvaardigen.
- **Let op:** (oude) nesten van kraaiachtigen worden ook gebruikt door roofvogels en ransuilen. In dat geval zijn nesten jaarrond beschermd!

Bronnen Literatuur: LNV, 2009; Snow & Perrins, 1998; SOVON, 2002.
Websites: www.minlnv.nl;
www.nederlandsesoorten.nl; www.bto.org