



Kuifeend *Aythya fuligula*



Vrij kleine eend, met grote kop en kuif. Een volwassen mannetje heeft een zwart lichaam met een brede witte flank. Een volwassen vrouwtje is geheel donkerbruin.
Foto's: Ruben Fijn



- soort niet broedend
- mogelijk broedgeval
- broedgeval waarschijnlijk/zeker

Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec

Groen: Werkzaamheden mogelijk. Oranje: Werkzaamheden mogelijk: ja, mits na overleg met ecooloog en eventuele mitigerende maatregelen. Rood: Werkzaamheden mogelijk: nee, tenzij toestemming van de ecooloog en mitigerende maatregelen worden genomen.

Bestendig beheer en onderhoud (vrijstelling, mits gebruik gedragscode)

Maaien	Zie gedragscode, aanvullend: Waar de soort (mogelijk) broedt alleen in de periode van half september t/m april. Kuifeenden broeden op de grond in dichte vegetatie van riet of zeggen, in de nabijheid van water, soms in een groep.
Schonen	Zie gedragscode, aanvullend: Als onder maaien.
Baggeren	Zie gedragscode, aanvullend: Als onder maaien.
Snoeien/dunnen	-
Onderhoud waterkeringen	-
Onderhoud verhardingen	-

Ruimtelijke ontwikkelingen & inrichting (vrijstelling, mits gebruik gedragscode)

Vorbereiding van nieuwe werken	Zie gedragscode
Verwijderen bovengrond/ graafwerkzaamheden	Zie gedragscode, aanvullend: Waar de soort (mogelijk) broedt alleen in de periode van half september t/m april. Kuifeenden broeden op de grond in dichte vegetatie van riet of zeggen, in de nabijheid van water, soms in een groep.
Slopen kunstwerken of gebouwen	Zie gedragscode, aanvullend: Als onder verwijderen bovengrond.
Bouwactiviteiten	Zie gedragscode, aanvullend: Als onder verwijderen bovengrond.
Afdammen/dempen/vergraven	Zie gedragscode, aanvullend: Als onder verwijderen bovengrond.
Leefgebied	Broedt op oevers van meren en langzaam stromende rivieren.
Gebruik van het leefgebied	Jaarrond te vinden in waterrijke gebieden. In de winter talrijker door aanvulling van overwinterende populaties uit Noord- en Oost-Europa.
Voornaamste voedselbronnen	Driehoeksmosselen, kleine waterdieren en waterplanten.
Leefwijze door het jaar heen	De broedperiode loopt van begin mei tot midden september. Begin mei balts, in mei-september nesten en paren met jongen. Buiten het broedseizoen zijn de vogels in grote groepen te vinden op open en beschutte wateren.
Locatie nest	Op de grond of in water, in dichte vegetatie in riet of zeggenvegetatie in de nabijheid van water. Soms in hoge dichtheden.





Vervolg

Kuifeend *Aythya fuligula*

Aanbevelingen	Vermijden van betreding en het uitvoeren van werkzaamheden in gebieden met concentraties eenden in het winterseizoen (oktober-april).
Belang waterschapspopulaties	Groot nationaal belang
Verspreiding binnen Nederland	In Nederland algemeen. Tijdens het broedseizoen vrij algemeen in Noord- en West-Nederland en het rivierengebied, maar in lage dichtheden op droge zandgronden.
Rode lijst	-
Beschermingsstatus Vogelrichtlijn	Voor deze soort zijn Natura 2000-gebieden aangewezen.
FF-wet	Strengbeschermd, gelijkgesteld aan tabel 3
Bronnen	Literatuur: Snow & Perrins, 1998; LNV, 2009; SOVON, 2002. Websites: www.minlnv.nl ; www.nederlandsesoorten.nl ; www.bto.org

