




Kwak *Nycticorax nycticorax*



Middelgrote, compacte reiger. Een volwassen dier heeft een zwarte kruin en rug. Een juveniel is donker grijsbruin met valse vlekken op de rug.

Foto: Rein Hofman



- soort niet broedend
- mogelijk broedgeval
- broedgeval waarschijnlijk/zeker

Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec

Groen: Werkzaamheden mogelijk. Oranje: Werkzaamheden mogelijk: ja, mits na overleg met ecooloog en eventuele mitigerende maatregelen. Rood: Werkzaamheden mogelijk: nee, tenzij toestemming van de ecooloog en mitigerende maatregelen worden genomen.

Bestendig beheer en onderhoud (vrijstelling, mits gebruik gedragscode)

Maaien	Zie gedragscode, aanvullend: Waar de soort (mogelijk) broedt alleen in de periode van september tot half april. De kwak broedt in kolonies in bomen en struiken en ook in riet.
Schonen	Zie gedragscode, aanvullend: Als onder maaien.
Baggeren	Zie gedragscode, aanvullend: Als onder maaien.
Snoeien/dunnen	Zie gedragscode, aanvullend: Als onder maaien.
Onderhoud waterkeringen	-
Onderhoud verhardingen	-

Ruimtelijke ontwikkelingen & inrichting (vrijstelling, mits gebruik gedragscode)

Vorbereiding van nieuwe werken	Zie gedragscode
Verwijderen bovengrond/ graafwerkzaamheden	Zie gedragscode Waar de soort (mogelijk) broedt alleen in de periode van september tot half april. De kwak broedt in kolonies in bomen en struiken en ook in riet.
Slopen kunstwerken/gebouwen	Zie gedragscode, aanvullend: Als onder verwijderen bovengrond.
Bouwactiviteiten	Zie gedragscode, aanvullend: Als onder verwijderen bovengrond.
Afdammen/dempen/vergraven	Zie gedragscode, aanvullend: Als onder verwijderen bovengrond.
Leefgebied	Broedt in moerasgebieden met ondiep water. In de winter grotendeels verblijvend in Zuid-Europa en Afrika.
Gebruik van het leefgebied	In het broedseizoen te vinden in ondiepe moerassen met opgaande vegetatie.
Voornaamste voedselbronnen	Vis, amfibieën en kleine aquatische dieren.
Leefwijze door het jaar heen	De broedperiode loopt van midden april tot eind augustus. Vanaf midden april balts en van eind april-eind augustus nesten en paren met jongen. Overwinterend in Afrika.
Locatie nest	Voornamelijk in bomen en struiken, maar ook in riet (bij afwezigheid van natuurlijke vijanden).

Vervolg: zie pagina 2



Vervolg

Kwak *Nycticorax nycticorax*

Aanbevelingen

- Vermijd wijzigingen van het waterpeil binnen de voortplantingsperiode.
- Vermijd betreding en het uitvoeren van werkzaamheden in potentiële broedbiotopen gedurende het broedseizoen.
- Vermijd betreding en het uitvoeren van werkzaamheden rond zonsopgang en zonsondergang in de omgeving van slaapplekken.

Belang waterschapspopulaties

Nationaal belang

Verspreiding binnen Nederland

In Nederland zeldzaam. Tijdens het broedseizoen zeldzaam, waarbij het merendeels gaat om broedgevallen van uitgezette exemplaren in Amsterdam en Rotterdam.

Rode lijst

In het wild verdwenen uit Nederland (2004)

Beschermingsstatus Vogelrichtlijn

-

FF-wet

Strengbeschermd, gelijkgesteld aan tabel 3

Bronnen

Literatuur: den Boer *et al.*, 2000; LNV, 2009; Snow & Perrins, 1998; SOVON, 2002.

Websites: www.minlnv.nl;

www.nederlandsesoorten.nl; www.bto.org

