



Kwartel *Coturnix coturnix*



Zeer klein hoen. Geelbruin verkleed met donkerbruine strepen op bovenzijde en lichte buik. Kop met gestreepte tekening, mannetjes met een zwarte baan over de keel. Snelle vlucht met relatief lange vleugels.

Foto: Luc Hoogenstein/
Buiten-Beeld



- soort niet broedend
- mogelijk broedgeval
- broedgeval waarschijnlijk/zeker

Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec

Groen: Werkzaamheden mogelijk. Oranje: Werkzaamheden mogelijk: ja, mits na overleg met ecooloog en eventuele mitigerende maatregelen. Rood: Werkzaamheden mogelijk: nee, tenzij toestemming van de ecooloog en mitigerende maatregelen worden genomen.

Bestendig beheer en onderhoud (vrijstelling, mits gebruik gedragscode)

Maaien	Zie gedragscode, aanvullend: Waar de soort (mogelijk) voorkomt alleen maaien in de periode van oktober t/m april. De kwartel maakt zijn nest vaak in de dekking van een gewas of graspol.
Schonen	Zie gedragscode, aanvullend: Als onder maaien.
Baggeren	Zie gedragscode, aanvullend: Als onder maaien.
Snoeien/dunnen	-
Onderhoud waterkeringen	Zie gedragscode, aanvullend: Als onder maaien omdat binnen de periode mei t/m september nesten en jongen aanwezig kunnen zijn (met name op zandige dijktafsluitingen).
Onderhoud verhardingen	-

Ruimtelijke ontwikkeling en inrichting (vrijstelling, mits gebruik gedragscode)

Vorbereiding van nieuwe werken	Zie gedragscode
Verwijderen bovengrond/ graafwerkzaamheden	Zie gedragscode, aanvullend: Waar de soort (mogelijk) voorkomt alleen maaien in de periode van oktober t/m april. De kwartel maakt zijn nest vaak in de dekking van een gewas of graspol.
Sloop kunstwerken en gebouwen	-
Bouwactiviteiten	Zie gedragscode, aanvullend: Als onder verwijderen bovengrond.
Afdammen/dempen/vergraven	-
Leefgebied	Soort van open landbouwgebied en graslanden. Voorkeur voor uitgestrekte klavervelden en graanakkers. Ook wel in (vergraste) heide- en duinlandschappen.
Gebruik van het leefgebied	Zeer verborgen levend op de grond tussen (gecultiveerde) vegetatie van maximaal één meter hoog. Zelden te zien. Sluipt ongemerkt weg bij onraad. Foerageert door afwisselend met snavel te pikken en met poten te krabben. Territoriaal in het broedseizoen. Mannetje 's nachts veelvuldig baltsroep voortbrengend om vrouwtjes te lokken. Trekt in de winter naar Afrika.

Vervolg: zie pagina 2



Vervolg

Kwartel *Coturnix coturnix*

Voornaamste voedselbronnen	Alleseter, o.a. zaden en insecten.
Leefwijze door het jaar heen	Buiten het broedseizoen sociaal in groepen. Tijdens het broedseizoen solitair of in paren. Een deel van de populatie is polygaam. Broedperiode van begin mei tot eind september. Eieren en jongen aanwezig van midden mei tot eind augustus. Vliegvlugge jongen aanwezig op de broedlocaties tot eind september. Trekt weg vanaf eind augustus tot in oktober en overwintert grotendeels ten zuiden van de Sahara.
Locatie nest	Grondbroeder, nest doorgaans enigszins in de dekking van een gewas of graspol.
Aanbevelingen	Waarborgen akkerbouw van granen, graszaad, klaver, luzerne en karwij, met name op zandgronden aangezien kwartels zeer frequent stof- en zandbaden.
Belang Waterschapspopulaties	Groot nationaal belang.
Verspreiding binnen Nederland	Aantallen fluctueren jaarlijks sterk, maar meestal vrij schaarse broedvogel in met name de oostelijke helft van het land. De grootste bolwerken bevinden zich jaarlijks in Oost-Groningen, Drenthe, oostelijk Noord-Brabant en Flevoland.
Rode lijst 2004	-
Beschermingsstatus Vogelrichtlijn	Voor deze soort zijn geen Natura 2000-gebieden aangewezen.
FF-wet	Strengbeschermd, gelijkgesteld aan tabel 3
Bronnen	Literatuur: Bijlsma <i>et al.</i> 2001, LNV, 2009; Snow & Perrins 1998, SOVON 2002. Websites: www.minlnv.nl , www.nederlandsesoorten.nl .

