



Kwartelkoning *Crex crex*



Vrij slanke ral met een vrij lange hals, een afgerond lichaam en een korte, rechte snavel. Het verenkleed is geelbruin met blauwgrijze wenkbrauwstreep, borst en keel.

Foto: Natalia Paklina/

Buiten-Beeld

Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Groen: Werkzaamheden mogelijk. Oranje: Werkzaamheden mogelijk: ja, mits na overleg met ecooloog en eventuele mitigerende maatregelen. Rood: Werkzaamheden mogelijk: nee, tenzij toestemming van de ecooloog en mitigerende maatregelen worden genomen.

Bestendig beheer en onderhoud (vrijstelling, mits gebruik gedragscode)

Maaien	Zie gedragscode, aanvullend: Waar de soort (mogelijk) broedt alleen in de periode van half oktober tot half april. De kwartelkoning broedt op de grond in vochtige, dicht begroeide graslanden en ruigten.
Schonen	Zie gedragscode, aanvullend: Als onder maaien.
Baggeren	Zie gedragscode, aanvullend: Als onder maaien.
Snoeien/dunnen	-
Onderhoud waterkeringen	-
Onderhoud verhardingen	-

Ruimtelijke ontwikkelingen & inrichting (vrijstelling, mits gebruik gedragscode)

Vorbereiding van nieuwe werken	Zie gedragscode
Verwijderen bovengrond/ graafwerkzaamheden	Zie gedragscode, aanvullend: Waar de soort (mogelijk) broedt alleen in de periode van half oktober tot half april. De kwartelkoning broedt op de grond in vochtige, dicht begroeide graslanden en ruigten.
Slopen kunstwerken/gebouwen	-
Bouwactiviteiten	Zie gedragscode, aanvullend: Als onder verwijderen bovengrond.
Afdammen/dempen/vergraven	Zie gedragscode, aanvullend: Als onder verwijderen bovengrond.

Leefgebied
Broedt in vochtige, dicht begroeide graslanden en ruigten.
In de winter verblijvend in Afrika.

Gebruik van het leefgebied
In het broedseizoen is de kwartelkoning te vinden in vochtige graslanden met een voorkeur voor een vegetatiehoogte > 50 centimeter.

Voornaamste voedselbronnen
Ongewervelden, zaden en vruchten.


Leefwijze door het jaar heen
De broedperiode loopt van midden april tot midden oktober. Eind april balts, in mei-midden oktober nesten en paren met jongen. De soort overwintert in Afrika.

Locatie nest
Op de grond in dichte vegetatie.

Aanbevelingen

- Vermijd wijzigingen van het waterpeil binnen de voortplantingsperiode.
- Vermijd betreding en het uitvoeren van werkzaamheden in potentiële broedbiotopen gedurende het broedseizoen.
- Maaien en oogsten na het broedseizoen.

Vervolg: zie pagina 2



- soort niet broedend
- ◐ mogelijk broedgeval
- ◑ broedgeval waarschijnlijk/zeker





Vervolg

Kwartelkoning *Crex crex*

Belang waterschapspopulaties	Groot nationaal belang
Verspreiding binnen Nederland	In Nederland onregelmatig in wisselende aantallen. Kerngebieden zijn Groningen en het rivierengebied
Rode lijst	Kwetsbaar.
Beschermingsstatus Vogelrichtlijn	Voor deze soort zijn Natura 2000-gebieden aangewezen.
FF-wet	Strengbeschermd, gelijkgesteld aan tabel 3
Bronnen	Literatuur: Snow & Perrins, 1998; LNV, 2009; SOVON, 2002. Websites: www.minlnv.nl ; www.nederlandsesoorten.nl ; www.bto.org

