



Tabel 3

Laatvlieger *Eptesicus serotinus*



Vrijwel onmiskenbaar door het grote formaat en het donkere uiterlijk. Rugvacht donker- tot roodbruin. Snuit, oren en vleugels zwartbruin. Brede vleugels.

Foto: René Janssen/Buiten-Beeld

Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec

Groen: Werkzaamheden mogelijk. Oranje: Werkzaamheden mogelijk: ja, mits na overleg met ecooloog en eventuele mitigerende maatregelen. Rood: Werkzaamheden mogelijk: nee, tenzij toestemming van de ecooloog en mitigerende maatregelen worden genomen.

Bestendig beheer en onderhoud (vrijstelling mits gebruik gedragscode)

Maaien	-
Schonen	-
Baggeren	-
Begrazen	-
Snoeien/dunnen	Zie gedragscode
Onderhoud waterkeringen	-
Onderhoud verhardingen	-

Ruimtelijke ontwikkeling en inrichting (ontheffingsplicht)

Vorbereiding van nieuwe werken	Zie gedragscode
Verwijderen bovengrond/ graafwerkzaamheden	-
Sloop kunstwerken en gebouwen	Zie gedragscode, aanvullend: Periode waarin werkzaamheden bij voorkeur plaats vinden: - In geval van zomerverblijfplaats: september t/m februari - In geval van winterverblijfplaats: mei t/m september Pas nadat is vastgesteld dat de verblijfplaatsen zijn verlaten, kan worden gestart met werkzaamheden.
Bouwactiviteiten	-
Afdammen/dempen/ vergraven wateren	-

Leefgebied	Open en halfopen landschap;
Gebruik van het leefgebied	<i>Zomerverblijven</i> : gebouwen (huizen, kerken; onder dakpannen, achter daklijsten, in spouwmuren). Er wordt een netwerk van verblijfplaatsen bewoond. <i>Winterverblijven</i> : zie zomerverblijven <i>Foeragegebied</i> : open gebied zoals vochtige graslanden en akkers, randen van stedelijk gebied, maar ook in de stad in onbebouwd gebied en in parken. <i>Vliegroutes</i> : lijnvormige landschapselementen (o.a. bomenrijen, holle wegen). <i>Paarplaatsen</i> : zie zomerverblijven.

Voornaamste voedselbronnen	Nachtvlinders, kevers en muggen Vervolg: zie pagina 2
----------------------------	--



- soort niet waargenomen
- soort (recent) waargenomen

3



Vervolg

Laatvlieger *Eptesicus serotinus*

Leefwijze door het jaar heen Leven jaarrond in Nederland in kolonies. Nachtactief. Jachtgebied in regel binnen straal van 4 km rondom kolonieplaats. In zomer leven vrouwtjes in kraamkolonies (tientallen dieren). Mannetjes leven zomers apart van de vrouwtjes, solitair of in kleine groepjes (1-10 dieren). Kraamtijd: half juni-augustus. Paartijd: september-oktober. In de periode november-maart houden de dieren een winterslaap. Afstand tussen winter- en zomerverblijven enkele tot max. 50 km.

Aanbevelingen - Vliegroutes in tact laten door het veiligstellen van opgaande elementen in een gesloten landschap en het (gedeeltelijk) sparen van houtwallen en/of singels.
- Aanplant opgaande begroeiing (houtsingels, bosschages).
- Vernatting

Belang waterschapspopulaties Nationaal belang

Verspreiding binnen Nederland Algemeen. Komt verspreid over heel Nederland voor. Ten zuiden van grote rivieren, uitgezonderd Limburg, lijkt de laatvlieger minder voor te komen. De grootte van de Nederlandse populatie wordt geschat op 30.000-50.000 dieren.

Rode lijst -

Beschermingsstatus

Habitatrichtlijn Bijlage IV

FF-wet Tabel 3

Bronnen Lange *et al.* 1994; Broekhuizen *et al.* 1992; Limpens *et al.* 1997;
Websites: www.minlnv.nederlandsesoorten.nl