




## Lepelaar *Platalea leucorodia*



Grote vogel met een lange hals, een grote kop en een lange, brede spatelvormige snavel. Verenkleeft vrijwel geheel wit. Staat hoog op de poten.

Foto: Eelke Schoppers



- soort niet broedend
- mogelijk broedgeval
- broedgeval waarschijnlijk/zeker

Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec

Groen: Werkzaamheden mogelijk. Oranje: Werkzaamheden mogelijk: ja, mits na overleg met ecooloog en eventuele mitigerende maatregelen. Rood: Werkzaamheden mogelijk: nee, tenzij toestemming van de ecooloog en mitigerende maatregelen worden genomen.

### Bestendig beheer en onderhoud (vrijstelling, mits gebruik gedragscode)

Maaien	Zie gedragscode, aanvullend: Waar de soort (mogelijk) broedt alleen in de periode van september t/m maart. De lepelaar broedt in kolonies in bomen of riet in moeras-, duin- en kweldergebieden.
Schonen	Zie gedragscode, aanvullend: Als onder maaien.
Baggeren	Zie gedragscode, aanvullend: Als onder maaien.
Snoeien/dunnen	Zie gedragscode, aanvullend: Als onder maaien.
Onderhoud waterkeringen	-
Onderhoud verhardingen	-

### Ruimtelijke ontwikkelingen & inrichting (vrijstelling, mits gebruik gedragscode)

Vorbereiding van nieuwe werken	Zie gedragscode
Verwijderen bovengrond/ graafwerkzaamheden	Zie gedragscode, aanvullend: Waar de soort (mogelijk) broedt alleen in de periode van september t/m maart. De lepelaar broedt in kolonies in bomen of riet in moeras-, duin- en kweldergebieden.
Slopen kunstwerken/gebouwen	Zie gedragscode, aanvullend: Als onder verwijderen bovengrond.
Bouwactiviteiten	Zie gedragscode, aanvullend: Als onder verwijderen bovengrond.
Afdammen/dempen/vergraven	Zie gedragscode, aanvullend: Als onder verwijderen bovengrond.
Leefgebied	Broedt in moeras-, duin- en kweldergebieden. Foerageert in ondiep open water. Grootste deel van de populatie in de winter in Afrika.
Gebruik van het leefgebied	In het broedseizoen in riet en moerasbos (nest). Buiten het broedseizoen voornamelijk in gebieden met ondiep water en slik.
Voornaamste voedselbronnen	Insecten, vis, amfibieën en planten.
Leefwijze door het jaar heen	De broedperiode loopt van begin april tot eind augustus. Vanaf begin april balts en van midden april-eind augustus nesten en paren met jongen. Buiten de broedperiode verspreid langs grote ondiepe wateren.
Locatie nest	Koloniebroeder in bomen, in riet en in grote moerasgebieden.

Vervolg: zie pagina 2



## Vervolg

## Lepelaar *Platalea leucorodia*

### Aanbevelingen

- Vermijd wijzigingen van het waterpeil binnen de voortplantingsperiode
- Vermijd betreding en het uitvoeren van werkzaamheden in potentiële broedbiotopen gedurende het broedseizoen.
- Vermijd betreding en het uitvoeren van werkzaamheden rond zonsopgang en zonsondergang in de omgeving van slaappleatsen.

### Belang waterschapspopulaties

Ondergeschikt belang.

### Verspreiding binnen Nederland

In Nederland schaars tot plaatselijk algemeen. Tijdens het broedseizoen in hoge dichtheden in het waddegebied, in de Oostvaardersplassen en in Zeeland.

### Rode lijst

-

### Beschermingsstatus Vogelrichtlijn

Voor deze soort zijn Natura 2000-gebieden aangewezen.

### FF-wet

Strengbeschermd, gelijkgesteld aan tabel 3

### Bronnen

Literatuur: den Boer *et al.*, van de Kam *et al.*, 1999; LNV, 2009; 2000; Snow & Perrins, 1998; SOVON, 2002.

Websites: [www.nederlandsesoorten.nl](http://www.nederlandsesoorten.nl); [www.bto.org](http://www.bto.org); [www.minlnv.nl](http://www.minlnv.nl).

