




### Tabel 3

## Meervleermuis *Myotis dasycneme*



Kenmerkend voor *Myotis*-soorten: contrast tussen lichte buik en donkere rug. Oren altijd langer dan breed, maar bij de Meervleermuis relatief kort. Vrij grote soort (kopromp: 6-7 cm). Rugzijde middel tot donkerbruin, buikzijde grijswit. Gezicht donker grijsbruin met twee duidelijke neusknobbels. Polsen dik. Verwarring mogelijk met de kleinere watervleermuis.

Foto: Fleur van Vliet



- soort niet waargenomen
- soort (recent) waargenomen

3

Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec

Groen: Werkzaamheden mogelijk. Oranje: Werkzaamheden mogelijk: ja, mits na overleg met ecooloog en eventuele mitigerende maatregelen. Rood: Werkzaamheden mogelijk: nee, tenzij toestemming van de ecooloog en mitigerende maatregelen worden genomen.

#### Bestendig beheer en onderhoud (vrijstelling mits gebruik gedragscode)

Maaien	-
Schonen	-
Baggeren	-
Begrazen	-
Snoeien/dunnen	Zie gedragscode
Onderhoud waterkeringen	-
Onderhoud verhardingen	-

#### Ruimtelijke ontwikkelingen & inrichting (ontheffingsplicht)

Vorbereiding van nieuwe werken	Zie gedragscode
Verwijderen bovengrond/ graafwerkzaamheden	-
Sloop kunstwerken en gebouwen	Zie gedragscode, aanvullend: Periode waarin werkzaamheden dienen plaats te vinden: - In geval van zomerverblijfplaats: september t/m april - In geval van winterverblijfplaats: april t/m september Pas nadat is vastgesteld dat de verblijfplaatsen zijn verlaten, kan worden gestart met de werkzaamheden.
Bouwactiviteiten	-
Afdammen/dempen/ vergraven wateren	Zie gedragscode, aanvullend: Bij verwijderen/aantasten van wateren die van belang zijn als vliegroue of foerageergebied ontheffing aanvragen.

Leefgebied	Waterrijke gebieden.
Gebruik van het leefgebied	<i>Zomerverblijven:</i> gebouwen (in spouwmuren, op (kerk)zolders, onder dakpannen). Er wordt een netwerk van verblijfplaatsen bewoond. <i>Winterverblijven:</i> ondergronds in groeven, grotten, kelders, forten, vestingwerken, steenfabrieken. Incidenteel in gebouwen. <i>Foerageergebied:</i> kanalen, vaarten, plassen en meren, maar soms ook boven weilanden. <i>Vliegroutes:</i> lijnvormige landschapselementen (o.a. kanalen, brede vaarten, houtwallen, bomenrijen). <i>Paarplaatsen:</i> zie zomer- en winterverblijven. Jachtgebied in regel binnen straal van 10 km rondom kolonieplaats. De afstand tussen winter - en zomerverblijven kan meer dan 300 km bedragen.

Vervolg: zie pagina 2



## Vervolg

## Meervleermuis *Myotis dasycneme*

Voornaamste voedselbronnen	Muggen, vliegen en motten.
Leefwijze door het jaar heen	Leven jaarrond in Nederland in kolonies. Nachtactief. In de zomer leven vrouwtjes in kraamkolonies (60-400 dieren). Mannetjes leven zomers apart van de vrouwtjes. Kraamtijd: mei-juli. Paartijd: najaar/winter. Winterslaap: november-maart.
Aanbevelingen	<ul style="list-style-type: none"><li>- Vliegrouetes in tact laten door het veiligstellen van opgaande elementen in een gesloten landschap en het (gedeeltelijk) sparen van houtwallen en/of singels.</li><li>- Herplant van singels, bomenrijen. Fragmentatie opheffen.</li><li>- Verlichting langs vliegrouetes en geschikt foera-geergebied verwijderen.</li></ul>
Belang waterschapspopulaties	Groot internationaal belang
Verspreiding binnen Nederland	Vrij algemeen. Zwaartepunt van de verspreiding ligt in Noord- en West Nederland.
Rode lijst	-
Beschermingsstatus	
Habitatrichtlijn	Bijlagen II en IV
FF-wet	Tabel 3
Bronnen	Lange <i>et al.</i> 1994; Broekhuizen <i>et al.</i> 1992; Limpens <i>et al.</i> 1997; Website: <a href="http://www.minlnv.nederlandsesoorten.nl">www.minlnv.nederlandsesoorten.nl</a>