




Ooievaar *Ciconia ciconia*



Grote vogel met een lange hals, een grote kop en een lange, dolkachtige snavel. Verenklee wit met zwarte achtervleugel. Staat hoog op de poten.

Foto: Ewoud van der Ploeg



- soort niet broedend
- mogelijk broedgeval
- broedgeval waarschijnlijk/zeker

Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Nesten zijn jaarrond beschermd. Groen: Werkzaamheden mogelijk. Oranje: Werkzaamheden mogelijk: ja, mits na overleg met ecooloog en eventuele mitigerende maatregelen. Rood: Werkzaamheden mogelijk: nee, tenzij toestemming van de ecooloog en mitigerende maatregelen worden genomen.

Bestendig beheer en onderhoud (vrijstelling, mits gebruik gedragscode)

Maaien	-
Schonen	-
Baggeren	-
Snoeien/dunnen	Zie gedragscode, aanvullend: Nesten van ooievaars zijn jaarrond beschermd. De ooievaar broedt in bomen of op kunstmatige locaties (daken, palen).
Onderhoud waterkeringen	-
Onderhoud verhardingen	-

Ruimtelijke ontwikkelingen & inrichting (vrijstelling, mits gebruik gedragscode)

Vorbereiding van nieuwe werken	Zie gedragscode
Verwijderen bovengrond/graafwerkzaamheden	-
Sloop kunstwerken/gebouwen	Zie gedragscode Nesten van ooievaars zijn jaarrond beschermd. De ooievaar broedt in bomen of op kunstmatige locaties (daken, palen).
Bouwactiviteiten	Zie gedragscode, aanvullend: Als onder sloop.
Afdammen/dempen/vergraven	-
Leefgebied	Broedt in open landschappen met een hoge grondwaterstand, vaak in de nabijheid van ondiep water. In de winter verblijvend in Nederland (uitgezette dieren) of weg trekkend naar Afrika.
Gebruik van het leefgebied	In het broedseizoen in bomen en kunstmatige aangeboden locaties (nest), vochtige weiden en ondiep water (voedsel). Buiten het broedseizoen grotendeels in Zuid-Europa en Afrika.
Voornaamste voedselbronnen	Zoogdieren, amfibieën, grote insecten en vis.
Leefwijze door het jaar heen	De broedperiode loopt van midden maart tot eind augustus. Vanaf midden maart balts en van begin april-eind augustus nesten en paren met jongen. Buiten de broedperiode meer verspreid voorkomend.
Locatie nest	Bomen of kunstmatige locaties (daken, palen).
Aanbevelingen	- Nesten zijn jaarrond beschermd. - Vergroot het aanbod aan potentiële nestgelegenheid door het aanbrengen van kunstmatige nesten.

Vervolg: zie pagina 2



Vervolg

Ooievaar *Ciconia ciconia*

Belang waterschapspopulaties	Ondergeschikt belang.
Verspreiding binnen Nederland	In Nederland schaars (toenemende trend). Tijdens het broedseizoen voornamelijk in het rivierengebied, Overijssel en Zuid-Holland.
Rode lijst	-
Beschermingsstatus Vogelrichtlijn	-
FF-wet	Strengbeschermd, gelijkgesteld aan tabel 3. Jaarrond beschermd nest.
Bronnen	Literatuur: Snow & Perrins, 1998; LNV, 2009; SOVON, 2002. Websites: www.minlnv.nl ; www.nederlandsesoorten.nl ; www.bto.org

