



Pijlstaart *Anas acuta*



Grote, slanke eend met smalle spitse vleugels en lange staart. Een volwassen mannetje heeft een bruine kop, een witte borst en een witte tekening die van daaruit doorloopt in een witte lijn tot achter het oor. Een volwassen vrouwtje is lichtbruin met een fijn schubpatroon en een donkergrijze snavel.

Foto: Harvey van Diek/
Buiten-Beeld



- soort niet broedend
- mogelijk broedgeval
- broedgeval waarschijnlijk/zeker

Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec

Groen: Werkzaamheden mogelijk. Oranje: Werkzaamheden mogelijk: ja, mits na overleg met ecooloog en eventuele mitigerende maatregelen. Rood: Werkzaamheden mogelijk: nee, tenzij toestemming van de ecooloog en mitigerende maatregelen worden genomen.

Bestendig beheer en onderhoud (vrijstelling, mits gebruik gedragscode)

Maaien	Zie gedragscode, aanvullend: Waar de soort (mogelijk) broedt alleen in de periode van september t/m maart. De pijlstaart broedt op de grond in gras of zeggenvegetaties, meestal in de nabijheid van water.
Schonen	Zie gedragscode, aanvullend: Als onder maaien.
Baggeren	Zie gedragscode, aanvullend: Als onder maaien.
Snoeien/dunnen	-
Onderhoud waterkeringen	-
Onderhoud verhardingen	-

Ruimtelijke ontwikkelingen & inrichting (vrijstelling, mits gebruik gedragscode)

Vorbereiding van nieuwe werken	Zie gedragscode
Verwijderen bovengrond/ graafwerkzaamheden	Zie gedragscode, aanvullend: Waar de soort (mogelijk) broedt alleen in de periode van september t/m maart. De pijlstaart broedt op de grond in gras of zeggenvegetaties, meestal in de nabijheid van water.
Slopen kunstwerken/gebouwen	Zie gedragscode, aanvullend: Als onder verwijderen bovengrond.
Bouwactiviteiten	Zie gedragscode, aanvullend: Als onder verwijderen bovengrond.
Afdammen/dempen/vergraven	Zie gedragscode, aanvullend: Als onder verwijderen bovengrond.
Leefgebied	Broedt op oevers van moerassen, ondiepe meren en rivieren.
Gebruik van het leefgebied	Jaarrond te vinden in waterrijke gebieden. In de winter talrijker door aanvulling van overwinterende populaties uit Noord- en Oost-Europa.
Voornaamste voedselbronnen	Plankton en kleine aquatische organismen.
Leefwijze door het jaar heen	De broedperiode loopt van begin april tot eind augustus. Begin april balts, van midden april-september nesten en paren met jongen. Buiten het broedseizoen zijn de vogels in groepen te vinden op open en beschutte wateren.
Locatie nest	Op de grond in open tot dichte vegetatie in gras of zeggen, meestal in de nabijheid van water (< 200 m), soms echter tot 2000 meter van het water verwijderd.

Vervolg: zie pagina 2



Vervolg

Pijlstaart *Anas acuta*

Aanbevelingen	<ul style="list-style-type: none">- Vermijd wijzigingen van het waterpeil binnen de voortplantingsperiode.- Vermijd betreding en het uitvoeren van werkzaamheden in potentiële broedbiotopen gedurende het broedseizoen.- Vermijd betreding en het uitvoeren van werkzaamheden in gebieden met concentraties eenden in het winterseizoen (augustus-maart).
Belang waterschapspopulaties	Groot nationaal belang
Verspreiding binnen Nederland	In Nederland algemeen. Tijdens het broedseizoen voornamelijk in zeer kleine aantallen verspreid over Nederland, voornamelijk in de kustprovincies.
Rode lijst	Bedreigd
Beschermingsstatus Vogelrichtlijn	Voor deze soort zijn Natura 2000-gebieden aangewezen.
FF-wet	Strengbeschermd, gelijkgesteld aan tabel 3
Bronnen	Literatuur: van de Kam <i>et al.</i> 1999; LNV, 2009; Snow & Perrins, 1998; SOVON, 2002. Websites: www.minlnv.nl ; www.nederlandsesoorten.nl ; www.bto.org

