




Tabel 2

Poppenorchis *Aceras anthropophorum*



Lage tot middelhoge plant. De onderste, langwerpige bladeren komen al voor de winter boven. De aar is lang, smal en rolrond. De bloemen zijn lichtgroen en vaak rood gerand.

Foto: Floris Brekelmans



- soort niet aanwezig
- soort (recent) aanwezig

2

Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Groen: Werkzaamheden mogelijk. Oranje: Werkzaamheden mogelijk: ja, mits na overleg met ecooloog en eventuele mitigerende maatregelen. Rood: Werkzaamheden mogelijk: nee, tenzij toestemming van de ecooloog en mitigerende maatregelen worden genomen.

Bestendig beheer en onderhoud (vrijstelling, mits gebruik gedragscode)

| | |
|-------------------------|---|
| Maaien | Zie gedragscode |
| Maaisel afvoeren. | |
| Schonen | Zie gedragscode |
| Baggeren | Zie gedragscode |
| Begrazen | Zie gedragscode |
| | Extensieve schapenbegrazing, alleen begrazing buiten de bloeiperiode (juli t/m april). |
| Snoeien/dunnen | Zie gedragscode |
| | Bomen of struiken verwijderen kan gunstig zijn. |
| Onderhoud waterkeringen | Zie gedragscode, aanvullend: Groeiplaatsen ontzien of desnoods plant met een ruime hoeveelheid grond uitgraven en zo snel mogelijk overzetten op een geschikte locatie, onder begeleiding van een deskundige. |
| Onderhoud verhardingen | Zie gedragscode |

Ruimtelijke ontwikkelingen & inrichting (vrijstelling, mits gebruik gedragscode)

| | |
|---|---|
| Vorbereiding van nieuwe werken | Zie gedragscode |
| Verwijderen bovengrond/graafwerkzaamheden | Zie gedragscode, aanvullend: Groeiplaatsen ontzien of desnoods plant met een ruime hoeveelheid grond uitgraven en zo snel mogelijk overzetten op een geschikte locatie, onder begeleiding van een deskundige. |
| Sloop kunstwerken en gebouwen | - |
| Bouwactiviteiten | - |
| Afdammen/dempen/vergraven | - |

Groeiplaats Groeit op zonnige tot licht beschaduwde, droge plaatsen, op kalkrijke, humushoudende grond. Komt in Zuid-Limburg vooral voor op plaatsen waar recent struiken zijn gerooid.

Leefwijze door het jaar heen Overblijvende vaatplant (meerjarig). Bloeiperiode: mei-juni. Verspreiding van zaad door de wind in juli. Bovengrondse delen sterven af in de winter.

Aanbevelingen

- Maatregelen om vergrassing, te sterke struweelvorming en verzuivering tegen te gaan, door schapenbeheer (niet tijdens de bloei), indien nodig aangevuld met maaibeheer
- Struweel en bos verwijderen en pioniersituaties creëren op potentieel geschikte groeiplaatsen, vooral in de buurt van bekende vindplaatsen.

Vervolg: zie pagina 2



Vervolg

Poppenorchis *Aceras anthropophorum*

| | |
|-------------------------------|--|
| Belang Waterschapspopulaties | Ondergeschikt belang |
| Verspreiding binnen Nederland | Is zeldzaam geworden in Limburgse kalkgraslanden. Zeer zeldzaam in de Hollandse duinen (Voorne, Velsen) en in Zeeland (Breskens). |
| Status Rode lijst | Kwetsbaar |
| Beschermingsstatus | |
| Habitatrichtlijn | - |
| FF-wet | Tabel 2 |
| Bronnen | Kreutz & Dekker, 2000. Weeda <i>et al.</i> , 2003. Websites: www.mergellandschaap.nl ; www.minlnv.nederlandsesoorten.nl ; www.soortenbank.nl |