



## Purperreiger *Ardea purpura*



Grote vogel met een lange hals, een grote kop en een lange, dolkachtige snavel. Verenkled blauwgrijs tot roodbruin, maar altijd met roodbruine nek en kop. Staat hoog op de poten.

Foto: Rein Hofman

Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Groen: Werkzaamheden mogelijk. Oranje: Werkzaamheden mogelijk: ja, mits na overleg met ecooloog en eventuele mitigerende maatregelen. Rood: Werkzaamheden mogelijk: nee, tenzij toestemming van de ecooloog en mitigerende maatregelen worden genomen.


### Bestendig beheer en onderhoud (vrijstelling, mits gebruik gedragscode)

Maaien	Zie gedragscode, aanvullend: Waar de soort (mogelijk) broedt alleen in de periode van half september tot half april. De purperreiger broedt in kolonies nabij open water, meestal in riet maar ook in bomen.
Schonen	Zie gedragscode, aanvullend: Als onder maaien.
Baggeren	Zie gedragscode, aanvullend: Als onder maaien.
Snoeien/dunnen	Zie gedragscode, aanvullend: Als onder maaien.
Onderhoud waterkeringen	-
Onderhoud verhardingen	-

### Ruimtelijke ontwikkelingen & inrichting (vrijstelling, mits gebruik gedragscode)

Vorbereiding van nieuwe werken	Zie gedragscode
Verwijderen bovengrond/ graafwerkzaamheden	Zie gedragscode Waar de soort (mogelijk) broedt alleen in de periode van half september tot half april. De purperreiger broedt in kolonies nabij open water, meestal in riet maar ook in bomen.
Slopen kunstwerken/gebouwen	Zie gedragscode, aanvullend: Als onder verwijderen bovengrond.
Bouwactiviteiten	Zie gedragscode, aanvullend: Als onder verwijderen bovengrond.
Afdammen/dempen/vergraven	Zie gedragscode, aanvullend: Als onder verwijderen bovengrond.
Leefgebied	Broedt in dichte (riet)moerassen met sloten. Soms foeragerend in het veenweidegebied. In de winter verblijvend in Afrika.
Gebruik van het leefgebied	In het broedseizoen in afwisselende moeras- en veenweide-gebieden. Buiten het broedseizoen ook in meer open gebieden.
Voornaamste voedselbronnen	Vis, amfibieën, kleine zoogdieren en insecten.
Leefwijze door het jaar heen	De broedperiode loopt van midden april tot midden september. Vanaf midden april balts en van midden april-midden september nesten en paren met jongen. Buiten de broedperiode verspreid voorkomend.
Locatie nest	Koloniebroeder in de nabijheid van open water, meestal in riet, maar ook in bomen.

Vervolg: zie pagina 2



- soort niet broedend
- ◐ mogelijk broedgeval
- ◑ broedgeval waarschijnlijk/zeker





## Vervolg

## Purperreiger *Ardea purpura*

Aanbevelingen	<ul style="list-style-type: none"><li>- Vermijd wijzigingen van het waterpeil binnen de voortplantingsperiode</li><li>- Vermijd betreding en het uitvoeren van werkzaamheden in potentiële broedbiotopen gedurende het broedseizoen.</li><li>- Vermijd betreding en het uitvoeren van werkzaamheden rond zonsopgang en zonsondergang in de omgeving van slaapplekken.</li><li>- Soortgericht beheer. Ondermeer het stimuleren van natuurlijk waterpeilbeheer en de ontwikkeling van een structuurrijke moerasvegetatie (maatwerk).</li></ul>
Belang waterschapspopulaties	Groot nationaal belang.
Verspreiding binnen Nederland	In Nederland schaars tot plaatselijk algemeen. Tijdens het broedseizoen voornamelijk in Friesland, Overijssel, Noord- en Zuid-Holland en Utrecht.
Rode lijst	Bedreigd
Beschermingsstatus Vogelrichtlijn	Voor deze soort zijn Natura 2000-gebieden aangewezen.
FF-wet	Strengbeschermd, gelijkgesteld aan tabel 3
Bronnen	Literatuur: den Boer <i>et al.</i> , 2000; LNV, 2009; Snow & Perrins, 1998; SOVON, 2002. Websites: <a href="http://www.minlnv.nl">www.minlnv.nl</a> ; <a href="http://www.nederlandsesoorten.nl">www.nederlandsesoorten.nl</a> ; <a href="http://www.bto.org">www.bto.org</a>

