



Tabel 1

Ree *Capreolus capreolus*



Fijngebouwd, klein hert (schouderhoogte 60-80 cm). Zomervacht roodbruin, najaar grijsbruin. Billen (spiegel) wit. Mannetjes dragen deel van het jaar tot ca. 30 cm lange geweien met max. 3-4 vertakkingen.

Foto: Fleur van Vliet



- soort niet waargenomen
- soort (recent) waargenomen

1

Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Groen: Werkzaamheden mogelijk. Oranje: Werkzaamheden mogelijk: ja, mits na overleg met ecooloog en eventuele mitigerende maatregelen. Rood: Werkzaamheden mogelijk: nee, tenzij toestemming van de ecooloog en mitigerende maatregelen worden genomen.

Bestendig beheer en onderhoud (vrijstelling)

Maaien	Maaien bij voorkeur van augustus tot half mei. Dieren mogelijkheid geven om te vluchten.
Schonen	-
Baggeren	-
Begrazen	-
Snoeien/dunnen	Bij voorkeur van augustus tot half mei.
Onderhoud waterkeringen	-
Onderhoud verhardingen	-

Ruimtelijke ontwikkeling en inrichting (vrijstelling)

Vorbereiding van nieuwe werken	-
Verwijderen bovengrond/ graafwerkzaamheden	Bij voorkeur van augustus tot half mei. Dieren mogelijkheid geven om te vluchten.
Sloop kunstwerken en gebouwen	-
Bouwactiviteiten	-
Afdammen/dempen/ vergraven wateren	-
Leefgebied	Parklandschap: bos afgewisseld met akkers en weilanden. Bij voorkeur loof- of gemengd bos met enige ondergroei. Ook in open gebieden (kustduinen, heideterreinen, polders) en moerassen.
Gebruik van het leefgebied	Foerageergebied zowel in bos als in open landschap. Als slaapplek schrapen reeën 40-60 cm grote, ovaalvormige rustplaatsen (legers).
Voornaamste voedselbronnen	Kruiden, grassen, knoppen, loten van struiken en bomen, bladeren, paddenstoelen, landbouwgewassen.
Leefwijze door het jaar heen	In voorjaar en zomer leven reeën, m.u.v. het vrouwtje en haar jong(en) solitair, in winter in groepen. Met name in schemering actief. In de periode april/mei-augustus bezetten reeën territorium (gem. 12-15 ha). Paartijd: juli-augustus. Tussen half mei en half juni worden kalveren geboren. Zoogtijd duurt 3 maanden. Kalveren blijven tot volgend voorjaar bij hun moeder. Dichtheden variëren van 3 tot 100 dieren/ha.
Aanbevelingen	Aanleg uittreeplaatsen langs steile en/of beschoeiende oevers.
Belang waterschapspopulaties	Ondergeschikt belang
Verspreiding binnen Nederland	Algemeen. Verspreid in heel Nederland. Niet op de Waddeneilanden m.u.v. Ameland en Terschelling. Zwaartepunt van de verspreiding ligt in het oosten van het land.

Vervolg: zie pagina 2



Vervolg

Ree *Capreolus capreolus*

Rode lijst	-
Beschermingsstatus	
Habitatrichtlijn	-
FF-wet	Tabel 1
Bronnen	Lange <i>et al.</i> 1994; Broekhuizen <i>et al.</i> 1992; Websites: www.minlnv.nederlandsesoorten.nl ; www.vzz.nl