



Tabel 2

Rietorchis *Dactylorhiza majalis praetermissa*



Middelhoge slanke orchidee. De smalle bladeren zijn lichtgroen en kunnen ringvormige vlekken hebben of ongevlekt zijn. Bloemblaadjes zijn roze tot paarsrood. Onderscheid met brede orchis is niet altijd mogelijk als gevolg van hybridisatie. De plant bloeit gemiddeld een maand later dan de brede orchis.

Foto: Janneke van Goethem



- soort niet aanwezig
- soort (recent) aanwezig

2

Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Groen: Werkzaamheden mogelijk. Oranje: Werkzaamheden mogelijk: ja, mits na overleg met ecooloog en eventuele mitigerende maatregelen. Rood: Werkzaamheden mogelijk: nee, tenzij toestemming van de ecooloog en mitigerende maatregelen worden genomen.

Bestendig beheer en onderhoud (vrijstelling, mits gebruik gedragscode)

Maaien	Zie gedragscode, aanvullend: Maaien vanaf augustus. Maaisel afvoeren.
Schonen	Zie gedragscode, aanvullend: Bij voorkeur schonen vanaf augustus. Geen plantmateriaal op groeiplaatsen laten liggen.
Baggeren	Zie gedragscode
Begrazen	Zie gedragscode, aanvullend: Zeer voorzichtig zijn met begrazing door grote grazers.
Snoeien/dunnen	Zie gedragscode
Onderhoud waterkeringen	Zie gedragscode, aanvullend: Groeiplaatsen ontzien of desnoods plant met ruime hoeveelheid grond uitgraven en zo snel mogelijk overzetten op een geschikte locatie, onder begeleiding van een deskundige.
Onderhoud verhardingen	Zie gedragscode

Ruimtelijke ontwikkelingen & inrichting (vrijstelling, mits gebruik gedragscode)

Vorbereiding van nieuwe werken	Zie gedragscode
Verwijderen bovengrond/ graafwerkzaamheden	Zie gedragscode, aanvullend: Groeiplaatsen ontzien of desnoods plant met ruime hoeveelheid grond uitgraven en zo snel mogelijk overzetten op een geschikte locatie, onder begeleiding van een deskundige.
Sloop kunstwerken en gebouwen	-
Bouwactiviteiten	-
Afdammen/dempen/vergraven	-

Groeiplaats Groeit op zonnige plaatsen op vochtige, niet te voedselrijke, niet of weinig bemeste, vaak kalkhoudende, humusrijke grond. Komt voor in graslanden, trilvenen en veenmosrietlanden, ook in opgespoten terreinen en in randen langs rietlanden. Toleranter ten opzichte van stikstof dan andere orchideeën, waardoor deze soort relatief algemeen is.

Leefwijze door het jaar heen Overblijvende plant (meerjarig). Bloeiperiode: juni-juli. Plant vormt zaad dat in de maanden juli-september via de wind wordt verspreid. Bovengrondse delen sterven af in de winter.

Aanbevelingen - Optimalisatie hydrologie: niet te droog, maar ook niet te nat; tegengaan verzuring, indien van toepassing: invloed kalkrijk grondwater stimuleren.

Vervolg: zie pagina 2



Vervolg

Rietorchis *Dactylorhiza majalis praetermissa*

- Maaien graslanden en (randen van) rietland om de successie te vertragen.
- Zeer voorzichtig omgaan met begrazing door grote herbivoren.

Belang Waterschapspopulaties

Groot internationaal belang

Verspreiding binnen Nederland

Nederland vormt met Engeland het zwaartepunt van de verspreiding van deze (onder)soort in de wereld. In Nederland plaatselijk vrij algemeen in het westen en midden, elders zeldzaam.

Status Rode lijst

-

Beschermingsstatus

Habitatrichtlijn

-

FF-wet

Tabel 2

Bronnen

Kreutz & Dekker, 2000. Van der Meijden, 2005. Weeda *et al.*, 2003.

Websites: www.minlnv.nederlandsesoorten.nl;
www.soortenbank.nl